Essentia Alexitha
Liquor Bezoardicus
Tinctura Mirandos

Pilul pector
mihi fecimt 4
Pulvis Dentifric 17
Lin. ad ... 1
Emplast Mirando 20
Bals Vulner 21
Bals Vitae Hof 35
Tr Saponis 53

Essentia Alexiphar:

℞ Rad: Angelic.
Imperator.
Helenii : aa ℥i.
Pimpinell: albae
Vincetox: aa ℥ij.
M. f. l. a. ꝑ suff: Dig: Ess: addat hinc extractioni aeq. portio Ess: Scordii et Serv: usui. NB. in febribus ardentibus contagiosis addi pt. Ess: Carlin et Valerian: in aequali portione.

Liquor Bezoardic: P:

℞ Herb: Scordii
card. Bened: aa Miij
Rad: Angelic:
Zedoar.
Petasitid: aa ℥i.
M. f. l. a. G: Camph: ℥ß pro usu addat. Ess: Laud: opi: et: Langelott. sua pars et Medicamentum in peste et febribus malignis expertissimum.

Rx Miraculosa. H:

℞ ♀ri crudi part: ij. ℥ij.
⊖ crudi partj. ℥i.
M. et f. l. a. Setenat. in ♁lo Δto post suffic: decton: affundat ▽ frigida ad solutione e.g. ℥viij filtret et servet postea ℞. ⊖ci ℥ij solvat in ▽ calida ℥viij filtra et M: est summum resolvens, in obstructionibus mensium

et.

et febribg intermitentibg inspecie 4tanis Dos: gtt 30. pro meliori Ra. acquirenda addi possunt gt. aliquod Elexir proprietatis.

Liquor Mineralis. n.

℞ ♃ri Crud: alb.
Ɵis Communis ā ℥ij.
Ob: purificat: ℥iv.
Limatur. ♂is: ℥j.
M. et f: l. a detonat: in +lo Δto. et calcinet paululum, postea solvat ∇. s. et servet usui. —

Pilul: Becch. n.

℞ Myrrha elect: ℥jß.
Aloes Succotrin ℥j.
G. Juniperi
Olibani:
Hederæ ∇r. āā ℥iij
Therebinth. Venet: ℥j.
Extr: Fumar:
Card: Benedict:
Cochleariæ.
Absynth:
Hellebori: nigr.
Millefol. āā ℥j.
M. in Mortar. calid et fiant Pilul: mediocr.

Pilul: Vitæ Mich: famil:

℞.

℞ Mastich:
Myrrhae
Aloes succotrin:
G. Ammoniac aa ℥i.
Olibani
Juniperi aa ℥ß.
Croc: orientalis ℥i.
M. f. c. s. q. Elix: p. p. M:

Pilul: Beck: refor:

℞ Extr. Absynth:
Fumar.
Card: Bened:
Centaur: min.
Millefol:
Helebor: nigr. aa ℥i.
G: Amoniac.
Olibani.
Myrrhae.
Heder: 🜄 aa ℥iß.
Pulv. l. Extr: Rhabarb:
foll: Senn: aa ℥ß
Trochisc: agar.
Alhandal. aa ʒiß.
Resin Jalapp. ℥ß.
Aloes Succotrin: ℥iij.
M. f. l. a. pilul medioc

Pilul: Aperitiv. n.

℞ Extr: Panchimag: Croll.
Hellebor. nigr. aa ℥i.

Aloes.

Aloes Succotrin.
Myrrh: Elect. aa ℥ß.
Resin Jalapp: ʒii
M. f: c. s. q. Elixir ppp. pilul. medioc.

Pilul Laxat. n.

℞. Extr: Sanch Croll: ℥ii
Cort: Orant:
Meliss: a ℥ß
Resin Jalapp.
Scamon aa ʒii.
☿ii dulci ʒvi.
M. f: l. a. pilul medioc: S pilul: antiscorb:

Pilul: pector mihi famil:

℞ Extract: Nicotian. ℥i.
Helebor: nig: ℥ß.
Millepedum: ppt: ʒii.
Flor: Benzoes ℈ii.
♁ns. ℈i.
Croc oriental: ℈ii l. ʒß.
M. f Pil: Medioer. D. Schultz.

Pilul. Francofurtens: –

℞. Aloes rosat ℥iii.
Diagryd:
Resin Jalapp. aa ℈i.
M. f: Pil. ex ℈i n. 30. dos: 15 bis 20.

Pil:

Pilula Abstersiv. Tappij.

℞ Resin: Jalapp:
Diagrÿd: ♀at:
Trochisc. Alhandal:
Extr: Panch: Croll:
Magist: ♃ Gott: aa ℥ß.
○○ Cariophÿll. ℈j.
M. f. c. sq. Elixir ppp. Pilul. instar pistor: Dos:
4. ad 5. stück. —

Pilul: Praserv. univers:

℞ Aloes succotrin ℥j.
Mÿrrh: elect: ʒij
Pulv. rad: Angelic: ʒij.
Confect Alkerm. ℈ij.
Mÿthridat:
Theriac.
▽ Lemn:
CC. s. △ pppt.
Pulv. gemmar. aa ʒj.
☉ fulminant. ℈ij.
M. f. c. ▽ flor. Sambuc pil: mediocr. sumant pro
Dos: 2. 3. l. 4 bis in una hebdomada 1. hor. ante
Coena. —

Mixtura Antiscorbut. generalis.

℞ Liquor ▽ foliat. ♀ri
Lixiv. ⊖ ♀ri p deliq: fact: aa ℥j.
Ess: flor: papav: Rhead: ℥ß.

M:

M. serv: us: Dos. a gtt: 60. ad 80 bis l. ter de die in scorbuto, calculo, podagra, et febrib.

♁ium Diaphoret. ☉ris

℞ ♁ij crud: optim: ℥i.
☉ purificat: ℥iv.
☉ foliat. ʒi.

♁io subtilissime pulverisato adde successive folia ☉ri, postea his probe mixtis in mortario lapideo super adde ☉tr: post suffic: mixtionem fiat detton: in 4to △to ita requirit massa reliniformis, quæ aliquantisper adhuc calcinet, ut impuritates omnes eo melius deflagrent, deinde ingeratur particulatim in ▽ calidam, et coquatur aliquantisper, ut ☉ris partes eo melius solvantur ab ♁io postea transficiatur per filtrum etc.

Lapis Medicamentos. Hesky.

℞: ☉i Cyprin l. Roman. ℥iv.
Boli Armen:
Cerussæ.
☉ purificat:
Alum: di Rocca aa ℥i.
⊖ Armoniac. ℥ß.

Diese species werden jedes insbesondere zu einem zarten Pulver, dann mischet solche wohl thun (?) sie in einen neuen Tiegel, giesst scharfen Weinessig darauf also dass er genug sein wird

Ge:

darüber gießen, setze es hernach über Kohl-feuer und laß den ∇. langsam kochen und endlich ad siccitatem abrauchen, so wird sich zu Ende ein rother Stein finden qui servatur usui.

Praeparatio ∇ae ex Lap: Medicament: Mar Kij.

℞. Lap: Medicament: H. ℥i.

pulverisiren solches sehr subtil. schütte das Pulver in einen neuen Topf und gieb VI. Quart rein brunnen ∇. darauf, mische es wohl unter einander, hernach lasse es etliche mahl bey gelindem feuer aufkochen; laß es kalt werden, und sich setzen, gieße es hernach ab u. filtrire es, und hebe zum gebrauch auf.

NB. Das auf dem boden des Topfes zurück gebliebene Pulver, nim heraus, trokne es an der Sonnen od gelinder wärme, und hebe es auf, denn es ist sonderlich guth zu austroknen den Pflaster und salben zu gebrauchen.

Ess: Uteri nostra.

℞ Rad: Diptam.
Galangae.
Zedoar.
Angelig.
Valenan
Vincetox aa ℥i.

Herb: Meliss.
Pulegiæ
Matricar.
Tanacet Roman:
Abrotan:
Artemisiæ aa Mj.
Castor — ℥ij
Croc: oriental. ℥j.
Succin alb: ℥iij
M. f. l. a. c. s. q. secund: extract: R. ♃ni Ess: filt: et serv. ad us:

Electuarium Consolidans. –

℞ Rad: Symphit: major. p. j.
Mellis Virgin: despumat p. ij.
Coquant ad Electuarij consistens: et addat Croc: orientalis. Pulvis Cinamom optim:
Cariophillor aromat pro lubitu secundum proportionem prioris.

Electuar: Pectoral. Consolidans. –

℞ Pulv. Rad: Helen:
Pimpinell alb:
Ireos florentin aa ℥ij.

Con:

Consolid: major. ℥ß.
Cinamom ophim: ℥ß. ℥i.
Croc: oriental: ℈i ℥ß.
Herb: Scordij
Urtic: minor. aa ℥ij.
Consev. Rosarum ℥ij.
M. f: c. s q. Syrup: Dialth: vel alio appropriat Electuar.

▽ Contr: Gutt: Rosac.

℞ ▽ lilior: alb:
fabar:
Rosar. rubr: aa ℥ij.
Flor: ♃ ris ℥ij.
Pulv: Nucis moschat: ℥i.
M: et serveh usui. ~

Decoct: Antiscorb: ~

℞ Rad: Salsaperill. ℥iv.
Herb: Salvia ℥i.
fol: Senn s: st: ℥ß.
♀ii Dulcis
Alumin: Sacchari a ℥ß.
Coquanh in VI Mensur: ▽ simpl. ad remanentia 4 Mensuras hiervon wird des Morgens und

und noch mittags, jedes mahl ein Messerl warm, bey d Mahlzeit ein decoctum secundarium und etwas Gut kalt loco Cerevisiæ getrunken. —

Purgans Vegetabile. —

Rx. Rad: Jalapp: ℥ij.
Turbeth alb. ℥ß.
Trochisc Alhand: ʒij.
Cremor ♃ri ℥iß.
Sacch: ʒij.
M. f. pulvis cujus dosis est à ℈ij. ad ʒj. usque

Liquor ☿lis resolvens. antiscorbuticus.

Rx. ☿ii vivi purificat ℥ß.
Nitrum purificat: ℥ij.
Terantur in mortario lapideo l. vitreo, donec nihil amplius de ☿io appareat postea solvatur in ▽ Mta appropriata l tantum simplici, filtretur et servetur usui.
Usus hujus Liq: ☿lis est tam internus quam externus interne datur ad gtt 50 ad 80 in decocto, ptisana, vel alio liquore appropriato externe vero applicetur tepide supra tumores scirrhosos l. alios locos affectos, præcipue in faucibus. —

Potiuncula purgans.

℞. ▽ fumar: ℥ß.
Resin. jalap. gr. xii.
Pane: Vitell: ovor.
Sacchar. q. s. pro edulcorat.
M. D. pro Dosi.

Vnguent. Saturnin.

℞. oo Saturni ℥vi.
Rosar:
Lilior. alb: aa ℔j.
Ceræ flav. ℔ß.
Camphor: ℥j.
M. f. l. a. sup. △ lenimet mediocris consistentiæ
NB. Loc oo Rosar. et Lilior: minoribus sumptibus
sumi pt oo Lini.

Sapo mundificans. Cont: Serpiginas vel alias impuritates cutis.

℞. Sapon. Venet. ℔ iv.
Storac: Calamitæ ℥vi.
Pulv. rad. Ireos flor. ℥ß.
Moschi: ℈j.
Storac Liquidæ ℥ij.
Lithargyr: ℥iij
oo Caryophyllor. gt. vi.

Cin:

Oo Cinamom. gt. iii
☿ij Precipitat alb. ℥ß.
M. f. l. a. sapon. ab. Loco ☿ sumi potest, Magiste=
Marcasitæ et hinc massa fit alba, c. contra vero nigra

Spirit: Ophthalmic: _

℞. Rad: Vincetoxic:
Helen.
Valerian.
Caniophillat.
Scorzoner: aa ℥i.
Herb. Euphras:
Chelidon. major.
Beton:
Melis:
Serpilli
Lavendul.
Basilic: aa Mj.
Flor: Lavendul:
Rosar:
Salviæ aa Mß. l.i
Sem. Foenicul.
Cort: Citr: aa ℥i.
Incis. et mixt. s. l. a. cum S. V. ✝ vit. [illegible]
et [illegible] clavellat secundum proportionē sumtis e Cu=
curbita albiori. _

Spiritus Familiaris.

℞. Herb. Absynth:

Scordij

Herb. Scordij.
Rutha
Arthemis:
Ros'marin:
Salvia
Hijsop:
Centaur. min:
Millefol.
Lavendul. aa M. ij.
Flor. Sambuci
Hijperici aa M. IV.
Bacc: Juniper:
Ciner: Clavellat aa ℔ j.
Calcis viv:
Sal. ci. aa ℥ IV.
M. f: infus: c XVI mensur. Ω frument pp diem et noctem in Vesica cuprea, deinde destillet leni Δ ad dimid: Aq. hic mirando cum successu externe applicand. in Vulneribus, tumoribg, luxationibg, Catarrhis paralyticis, apoplexia et paralysi, miscen pit Camphor. Sapon: Venet et aliis nervinis.

Decoct: Antiscorbut singular. –

℞. Rasur. lign: Sassafr. ℥ i.
Guajac: A.
Corticis ejusdem aa ℥ ij.
Rad. China: ℥ i.
Salsaparill. ℥ iij.
Lapat. major.
Pimpinell alb. aa ℥ i.

Liquir.

Rad. Liquirit ʒij.
Polypodij. ℥j
Herb: Chelidon: min:
Saponar.
Meliss.
Serpill. aa M. ij.
Flor. Salviæ
Rosar. aa M j.
Santal rubri.
Cort: Citri.
Cinamom: acut: aa ℥ß.
Sem. Foeniculi.
Coriand. aa ℥j.
M. f. l a. species pro decocto Antiscorbut.

∇a ad Conservationem Cutis.

℞. ∇a Pluviæ l Fluvin: M: IV.
Aluminis — ℥IV.
Mercur Sublimat: ʒij l. iij.
Borac: Venet: ʒvj.
G. Tragacant. elect. ʒij.
Camphor. ʒij.
Laß obign 4 quart ∇ ad remanentiam 2 mensur einkochen, dan hernach obign species wohl pul: verisiert in einen kleinen wohl ausgekochten Topf

Topf, giess den 2 mäyß ▽ darüber, verkleibe
den Topf: wohl mit einer stürtze, und lasse
es nochmalen 4tel Stunde mit einander
kochen Wann dieses geschehen, lass es kalt
oder lauch werden und filtriere es durch lösch
papier, hernach nim das weisse von 12 hü:
ner Eyer, schlage solches in einer irdenen
Schüssel mit einem holtzernen koch löffel
hin und her so lange biss es wie ein. subtiler
klaster wassere wird. gieb dieses geschla:
genen Eyerweiss wasser, zu den filtrierten
in das glass, jedes so dass der schaum nicht
mit hineinkomme, schüttle es wohl durchein
ander thue noch Kampher darzu, verwahre
das glas wohl mit blasen, und lass es et:
liche tagen stehen, dass es sich wohl melie
re. als denn hebe es auf zum gebrauch Mit die
sem ▽ wäschet m. abends das gantze gesich
te bey den waschen aber muss m. die augen
zu thun, so conserviret es das gesichte und
machet ein gantze gesichte reiner und rei
ne haut NB. das Eyweiß. ist bey diesem ▽.
höchst nöthig, den ohne dieses, würde sol:
ches der haut mehr schaden als nützen

Remedium in Variolis
ad curandum cicatric.
probatissimum. –

Wenn

Wann die Pocken in voller Blüthe stehen, nimt m. Spermacet: q.s. rühret über gelindem Kohlfeuer zusammen, daß es als ein Sälblein wird, so dann nimt man eine Feder, und bestreichet mit dieser Salbe die Pocken im gesicht und Händen, so drücken und heilen sie bald ab wann einem solche abgetrücknet sind, also daß ein Schorf od[er] grind daraus wird, so schmieret m. gleicher gestalt mit einer Feder zerlassen Mayen fett, dann wird die haut darunter wieder recht glatt, und d[er] patient bekomt keine Narben

Ess: Anodyn. Langel.

℞. Opii Thebaic: in part: Concis: ℔ i.
Succi Cidonior ℔ x.
Θ: Tartri ℥ i.
Sacchar albiss: ℥ IV.
Indat. Cucurbit bene Claus: et: in loco temperate Calido per Septimana deinde filtrat. et inspissat.

℞. Hujus Extract. l. inspis: ℥ ij
S Vin: rectificat ℔ j ß.
Digerat. in loc: temperate Calido ad intimiorem solution: serv. us.

Linimentum Contr: Stomac: ~

℞. Succi express: Sedi major ℥iv.
Acet: Squillit: ℥ij.
Coquat ad Mel aspind: Consistent: deinde addat
Alum: ust: ℥β.

Pulvis Dentific:

℞. ♀ri Crud: alb.
Oss: sepiæ aa ℥i.
Corall rubr: ℥β.
Rad: Ireos florent: ʒvi.
Alum: ust: ʒij.
Sacc in globul: n: ij.
N: M: n: ij
M. f pulv. cui pro lubitu add gtt Mosch. Ambr:
l. etiam ○○ S. odorat:

Alia Compositio.

℞. Spum c. Therm: Caros: ℥i.
Pulv. oss: sepiæ ℥β.
♀ri alb:
Aristol: rotund aa ʒvi.
Ireos florent: ʒij
Sanguin: Dracon ℥β.
○○ Caryophyl q: s.
M: f:

M. f. l. a. pulv.
NB. loco Alum: ust sumi pt ∇ Oli rubicunda dulcis.

Liniment: ad Dent:

℞ Pulv: Aristoloch: ℥ij.
Herb: Salvia
Rosmarin:
Myrrha
Cariophyllor. aa
Nux Moschata aa ʒij.
Corall. rubr:
Oss: Sepia.
Sanguin Dracon:
∇ Catech: aa ℥ß.
Alum: ust: ʒiij
Unguent: ægiphiac: ℥i.
M. f. c. s. q. Syrup. de rosis sicc: Liniment:
NB. ✝ Squillit mirifice firmat dentes, et sanitate conservat.
NB. ∇ ✝ uvæ ∇ Vinc: ß Vinc: l Aristoloch ☉ fact: mirifice dentes firmat, Stomacacen. medet

Medicament Contr: Læsion: Nervor:

℞. Extract Nicotian ℔i.

oo Olivar: l. Hyperic.
Axungia Ovil: aa ℥ix.
Therebynth ℥iij
Cera flava ℥iv.
M: et coquant ad Unguenti Consistentiam

Ess: Castor. Peter.

℞. Castor ℥ij
Spiritus vini ⚹ fat ℥vj.
Ra ⚹ni ℥iij
M. et digerent ad s. Extract:

Ess: Theriacal. Peter.

℞. Theriac: Androm: ℥iij
🜄 ⚹n fat: ℥vj.
M. et Diger. in loc: temperat: calido. S: u:

Emplast Camphorat in gnum. ex. C. L.

℞. Minij: ℔ß.
oo Olivar: ℔i.
Succin ppt: ℥ß. l. ij.
Camphor: ℥i.
oo Petr: alb: ℥i.
M. f. l. a. Emplast:

Empl:

Emplast: Rubert nigr.

℞. Oo Olivar: ℔ij.
Minii ℔i.
Oo Petr:
Juniperi: aa ℥i.
M. f. l. a Empl.

Emplast Miraculos:

℞. Oo Olivar. ℔ijß
Minii
Cerus: aa ℔i.
Sapon: Venet: ℥ijß
M. et coq: ad Emplast Consistent:

Emplastr: Sapon. nost: –

℞. Oo Olivar: l. Lini ℔ijß.
Sapon Venet: ℥ßv.
Resin pin:
Ceræ flav: aa ℥ij.
Therebinth: ℥i.
Cerus: in + vin: solut ℔i.
M. f. l. a. Emplast: cui addi potest in fine pro lubitu: Camphor ℥ij.

Bal:

Balsam: Vulnerar.

℞. Balsam: Peru. nig:
Styrac Liquid. aa ℥i.
G. Elemi
Mastich aa ℥ß.
Oo Hypericon: q:s:
M. sup △em fiat liniment tepide applicand
sup imposito emplastro 🜂is Ruland: l alio
potes etia Sacch: ♄ inspergi.

Bals: Vuln: nost:

℞. Ess: Myrrh:
Succin: aa ℥i.
Oo Therebinth: ʒi.
M. et serveh usui.

▽ ad Curat fistul.

℞. ⊖ alb. ℥ßV.
Camphor: ℥i.
subtiliss: pulv: calcinet in +bulo massa ad rube:
din: postea pulveris: calcinat et addat boli rubri
℥ß. f. usi:

℞. Hujus pulv. ℥i. ad ℔ß ▽ pluvial. post
Concoctione sufficient: decant ▽. s: usi: usus
huj

hujus V. c. ad eluend: fistul:

Pulv: Mundifican: Corosiv.

℞. ⊕ alb. Alum. ⊕is aa ℥i.
Acet. Vini ℥x ij Coquat. ad siccitat:
deinde Calcinet. donec usq. in pulv. redigi pt Mis:
Cum Unguent. Digestiv:, vel ægipsiac:

Sternutator in Pass. Hysteric:

℞. Castor. pulv. ʒi.
Hellebor. alb.
Piperis long: aa ℈j.
Pirethri ℈ß.
oo Succin: gtt. IV.
M. f. pulv. Sternut: gross. cum Castor.

Bals: Vulnerar ♄nin.

℞. Sacchar. ♄ni. qv. eg. ℥i.
Camphor. ʒij.
Affund: oo therebinth opt. ad eminent: 4.
digitor circiter, digerat. lent. calore donec Ra
rubini formis emergat. hinc decollet. et servet.
us. Est optimum Vulnerarium, interne externe
usurpandum. Interne vim primis in Gonorrhea

mira

mira pp[illegible] dat. ad gutt: x l. xii Extere solu attingunt, ulcera sordida, alias minus curabilia

Unguent Contr. Scabie et Tineae:

℞. Lythargyr: subt: pulv. ℔ß.
+ti vini optim: in ℥ij [illegible] solut:
Ol. Olivar. ℔j.

Misc. optime in mortar: Lapid: quousqs unguent: tenerrimi forma acquirat. addendo ali: quanto plus Ol. si sit eminente & delicatum et efficacissimum Unguent: ad scabiem tineamqs sanandam .. magisqs tenellas ac nitidas reddens.

Sal: Polychrest:

℞. Arcan: duplicat: ℥ij.
Tartar: Vitriolat:
Ol. tr. purificat: aa ℥j.
Tt factic: ℥ß.
Miscean: pt pro luto Anglic: l. alioqs propriati

Pulv: Aperitiv. mbr.

℞. Arcan: duplicat: ℥ij.
Ol. purificat: ℥j.
[illegible] diaphoret: ℥ijß.
Tt is [illegible] ℥ß.
M. f. l. a Pulv.

Pul:

Pulv. de Inbg.

℞. Lapid: ♋.
♁ diaphoret.
⊕ purificat: aa q.V.
M. et serv. us:

Spirit: Ophtalm: extemporan:

℞. ☊ rosar:
Lavendul:
Lilior Convall:
Foenicul.
Meliss aa ℥i.
°°° Anthos.
Lavendul: aa ℈i.
Cariophylor: ℈ß.
Cinamom gutt: IV.
M. S: in Vitro S: Morgens und abends den Augen binden damit zu streichen.

Decoct: Singul contra Tympanitid:

℞. Rad Salsaparill. ℥iV.
Rasur ligni Sanct. ℥iß.
lign Sassafr: c. cortic:
Rad: Chinæ aa ℥i.
Sem: Anis: ℥ij.

Herb:

Herb Fumar: M.iij
M. f: spec: pro decoct: —

▽ Ophthalm: Sing:

℞. Aloes ophim:
Sacch: Cand: aa ℥ij.
Camph: ℥ß.
▽ Euphras:
Rosar: rubr: ℥iij
M. et serv: post sufficient digest: usui. —

Pulv: Contr: Scabiem.

℞. Ocul: ♋. ℥ij.
♁ij diaphoret: ℥j.
Flor: ♃nis. ℥vj.
M. et serv: us:

Cataplasma Refrigerans.

℞. Farin: Hordei: ℥ij.
Vitell: Ovor: nº. ij.
Mell: ophim: ℥iß.
▽ Rosar: q: s ad Consist:
M. f cataplasma.

Laxans Tussim:

℞. Basilic: minor. ℥ij
Folia Senn: ℥j.
Sem: Anis. ℥ß.

Coquan:

Coquant in ▽. s. Mß. ad sufficient: extract refrige fact: D. pro dosi 3tia pars, et nisi operatio succed: successive reliquæ portiones dari possint miro cum successu dati grandis, infantibus et aliis qui rationis tex= turæ sunt:

Aliud de Manna.

℞. Mann: Calabrin: elect. ℥ij.
plus l. minus pro ratione circumstantiar: solvat in vino optimo: ℥vj. supp len. Δ post: Colet p. linte: et Det pro dosi impri: in obstructionibus pectoris à viscidatibus. –

Emplast Contr. Strumas et ganglion:

℞. Picis gravat. ℥ij.
Pipens Comun: ℥vj.
M. f: l. a Emplastr: s. u.

Pulv. Contr. Scabiem fenn:

℞. ☿ij dulc ℥ß.
Lapid: bg ℥iv.
M. D: quotidie ℈j in spec: si scabies à lue ♀ea l. Vermibus orta. –

Pilul: Universal: n.

℞. Mastich.
Myrrha
Aloes Socotrin

G

G. Amoniac: aa ℥j.
M. f. c. s. q. R̃a ☿ri Pilul mediocr. D. pro Dosi 5 l. 9.

Emplastr. Contr: Erysipelas.

℞. Ceræ flavæ ℥iv.
ol. lini ℥j. l. ʒij.
Unguent. dialth: ℥ß.
M. f: Emplastr: supp lent. △ conlesens wenn es fertig ist und auf ▽ gegossen werden und in Zapfen formiert werden.—

Ess: Cephalica externa.

℞. Rad: Hellebor: alb: ℥j.
Pyrethri
Euphorbii aa ℥ß.
grosse contusis affund ʒ s.v. ℔ß. post sufficient: extractionem R̃a colat filtret, ac penna ei immersa nares illinant, sic copiosa educet blenna ac cephalæa cita pertinx. præmissis pilul: purgantibg ex mercurio dulci supra traditis, vix perstabit.—

Spiritus antipodagricus extern.

℞. ⊖ ci
☿ viv.
△ur Cnid aa q v.
M. f. l. a. Aqu. ff. ō. tam ♎ separat ab ol.o foetido, et serv: usui.—

Pilul: Antiscorb: nbx:

℞.

℞. ♁ Nativ.
Antimon: aa ℥i.
Croc: Oriental: ℈j
Pulv: Castor ℥β.
Matris perlar: ℥i.
Sal volat. Succini l.
Cornu Cervi ℥β.
M. f. c. Mucillag: tragacanth: in ▽ Beton solut pilul mediocr: S. in Vitro Claus: –

Mixtura Antepilept:

℞. Ess: Castor.
Lilior convall:
Ra Corallor: aa ℥i.
Ω [illegible] ci l ⊖ Volat: ōō. ℥β.
M. S. in Vitr:

Pilul: Contr: Tuss: et Asthm:

℞. Extract Nicotian: ℥ij.
Hellebor: ℥i.
Helen:
Liquirit Croc ℥β.
Styrac: Calam: ℥ij.
Oliban
Myrrh:
G. Amon depurat aa ℥i.
M. f. c. s. q. Syrup. papav. alb. Pill mediocr. Dosi l. viij

Mixt:

Mixtura in Vomitu cruento.

℞. Ess: Millefol:
Myrrh: aa ℥i.
Croc: ℥ß.
M. et Sch:

Mixtura Antiparalit:

℞. Ess: Rhabarb:
Pimpinell alb: aa ℥ß.
M. D. ad gutt. 50 l. 60.
NB. Millepedi: recenter contusæ expressæ et c. Vino assumptæ Stranguriam mitigant et excretione ☐æ promovent. —

Remedium in Gonorrhea Virul: optim.

℞. Rad: Salsaparill: ℥ij.
Pimpinell alb:
Saponar: aa ℥i.
Coquat in ▽ simpl: et bibat tepide in fine add:
Rad: Symphit. Major. —

▽ Ophtalm: incomparab:

℞. ▽ Rosar:
Plantag:
Euphras: aa ℥ij.
Ol. Cipriñ ℈i.
Spir. Vini camphorat. ℈ß.

OXCI

Ol: ci ℥i.
M. applicet tepide.

▽ Ophthalm: Crea.

℞. Ol Alb: ℥ß.
Album: de 4. ovis sis calide subtiliss:
mis in mortario Lapideo, affundat:
▽ Foenicul:
Rosar: aa ℥i.
Cinamom: s.V: ℥ß. serv: us:

▽. Pectora: in Haemoptys.

℞. Herb: Veron: M:XV.
Bethon:
Cherefoliæ
Salviæ
Foenicul
Hepatic: nob: aa M.iij.
His omnibq recenter incisis fiat c̄ctio c. Vino Rhe=
nan: / Moselan. –

Pulv. in Haemophysi Laud:

℞. ✠ fachic: l. nativ.
⊕ purificat:
□ri Ocul aa ℥i.
℥ij diaphoret: ℈ij
M.

Mo de Cynogloss. gr. XII.

M. f. pulv. cui pro lubitu necessitate urgente addi potest: Croc. ♂tis adstringentis ad gr. VIII vel ad ℈ß. ubi vero fluxus sangui. moderatus existit, ℈ß sufficiunt

Species pro Decocto Vulnerar.

℞. Herb. Sanicul. M. ij.
Pyrol. M. i.
folia Symphy. M. ß.
Flor. Hyper. p. i.
M. f. l. a. Spec. als Thee zu gebrauchen. –

Mixtura Contr. Choleram.

℞. ▽ foliat. ♀ri ℥i.
solvat in Spiritu carminat. Sylv. l. alio app. prop. ℥i. digerat et servet usui dos. 50. ad 60 gutt.

Contant. –

℞. Tann. On. a ℥ij
pulv. Rad. An. ℥i.
pulv. Cinamom. ℥ß.
Sacchar. Finiss. ℥vi.
M. f. pulv. von Viertel ℥ ij. auf einen Morge milch zu nehmen. –

Pilul. Anti-colichico Antihisterica.

℞.

℞. Resin lign: Guajac ℥iß.
Bezoard: Mineral.
Antimon: aa ℥i.
Mat: perlat.
⊖ Volat: CC. l. succini. aa ʒi.
M. f. c. sq. Diascord: fracastor. à Sylv. correct: pilul. medioc. Dos: X. ad XX.

▽ Ophthalmic. Alochè.

℞. Aloes succotrin:
⊕l: alb: aa ℥i.
▽ Flor Cian.
Flor Cichor:
Foenicul: aa ℥i.
M. digeret. ad sufficient. extract. l. Mixtur: in anhören Tüchlein zu untzon, und von in auf zu bringen sind.

℞. Herb. Verben.
Euphras.
Betoni. aa M. i.
Flor. Cian.
Cichor. aa M. ß.
M. f. Spec. zum einigen Säcklein.

Linimentum Contra dolores Dentium

℞. Alum: liquefiat lento △e in Cochleari ferreo, liquefactum omne super infundat[ur]
lavi

levi Lapidi, postea subtillissime pulverisetur et misceatur ei oo Nucist: express. vel pulv: Nuc. Moschat ℥ß. postea fiat cum Melle puriori ℥ß. Linimentum serv. us:

NB. Fruct: l. Bacc Alkeken: gor: tostor dolores dentium sist: quando dentes pulv cor: infumantur.

Pulv: Contra febres intermitentes.

℞. Pulv sistulat: N: A: [illegible]
[illegible] ci purif: ℥iij.
[illegible] fact: ℥i.
M. f. pulv:

Unguent: Cont: Scabiem.

℞. ☿ viv. cum [illegible] amalgamat, terat: subtilis: c. aa portione ▽ neapolitan et f: c. s. q. Unguent Rosat l. alb. camphorat: Ungv. quo inungat: Carpi manuum, et pedum addi possunt. huic Unguent gutt aa liquor oo lign: Rhodij. ~

▽ Vulnerar: Seren: Princ: Roberti:

℞. oo. Oli affundat: successive ♎ Oli ad sufficientem mortificationem, postea destillet ex [illegible] vitrea in arena destillatum serveh usui. Liquor illa destillat: e. singulare remedium in vulneribus viscem NB. ex. Capit: mortuo exhalat: sal, quod solvat: in ▽ fly pene: l. Saniculi. Mediante hujus ▽ae Serenis: ille Princeps vulnera intestinarum curavit Vide Bech. pag. 58. ad 61. ~ Bat:

Balsam: Vuln: Tippel.

℞. ♎ Ol. Philosoph:
Acet. Atum. aa q. v.
M. f. Atio ex arena in ☉ ta Vitrea l. Cucurbita non admodum altiori.

▽ Archibusada.

℞. Herb. Salviæ.
Symphit: majus.
Numular:
Sanicul: aa M. IV.
Bellidis major.
minor.
Plantag: acut:
rotund.
long. l.
lati aa. M iij.
Beton:
Agrimon:
Verbenæ
Hyperic
Absinth:
foenicul
Scrophular: aa M ij.
Mixtis infundatur c. Vino albo ad M. 8. l x. per diem et noctem, post destillè. Vesica ▽ Atarei

reponat in Solem post serva usui.

Balsam: Vitæ &:

℞. Flor: l ♀ ci ℥ij.
Balsam Peruv: nigr. ℥ij
Styrac: Liquid. ℥i.
Ol. Lavendul:
Majoran:
Caryophyll. aa ℥i.
de Cedro. ℈j.
Menthæ ℈ij.
Ruthæ.
Succin alb: ℈ß.
Cinamom: ℈j.
Nucist &: ℈ß.
Mosch.
Ambræ aa gr: VI.
♀ Rosar:
Caryophyllor. aa ℥iv.
M. stent in digestione per aliquod ☉ et post et serv: usui.

NB. Herba Pyrolæ und ein wenig Wallwurtzel in wasser gesotten, vald: proficua est phthysicis et exulceratione pulmonum et renum laborantibus item grünen Rüben saat in Zingen weiss ge: kocht

Emplast: Contra: Gangl: singular.

℞. R: chn: pin: ℥iij
Liquefiat hyp Len: Δ. liquefact. adde ol Hyos:

Ol. Hyosciam: ℥ß.
Juniper. ʒi.
philosophor. ʒij.
Petræ ℥ß.
Hyperici ʒiij
Bolli rubr: ℥ß.
Talci Venin: ℥ßV.
Ceræ flavæ ʒiij
M. f. l. a. Emplastr. –

Foment: in doloribus intest: rect: ab Hæmor: Coec:

℞. Flor: Verbasc:
Chamæm: R: aa Mij.
Coquant in lacte et applicent tepide, cum Vesica Bovi l. Tauri add: quibus potest 🜄 Vini Camphor: sufficiunt interdum solum fomentationes è speciebus: superioribus quando l. a. applicent.

Antiscorbut et antipodagricum optim.

℞. Mineræ ♁ij l. Ant: Crud:
Ciner Clavell. ℔ß.
☿ viv: ℥Viii.
M. f. deton: in ✝ibulo. △to postea Calcinet et f. l. a. c. S V. R interne et externe usurp:

Ad Vomitum et Singultum sedandum.

℞.

℞. Baccæ Juniper:
flor: Rosar. rubr. sylvest.
Menthæ Crispa aa M i.
His omnibus pulv. mis: c. ferment et aceto accrrimo Vini calefacto, ut fiat una Massa, quæ calide ventriculo et scrobicul. Cordis imponat. –

Cataplasm Emolliens.

℞. Ferment accrim.
Sem Sinap.
Sapon nigr. aa ℥ i.
M. et sup imponat. tumoribus Emolliendis.

Decoct Antiscorb: in Gonorrh: Virul.

℞. Rasur: lign: sanct ℥ iij
Cort: ejusdem.
Sassafr: aa ℥ ß.
Rad: Salsepar. ℥ ij
China ℥ i
Pimpinell alb: ℥ ß.
Herb: Card: Bened:
Fumar: aa M. j.
Fol: Senn: Alexandrin.
s. St: ℥ ij l. iij.
℔ ij. Crud: in petlig:
℥ ii ~~viii~~ Curr. vio. in petlig: aa ℔ ß.
M. f. l. a. Decoct in oll: ben: Claus.

Liniment: Contr: Inflamat:

℞. Mell: Virgin: ℥ij.
farin: tritic: ʒß. Cuss Cult:
Sapon: Venet: ℥ß.
Spirit: frument: 2. Cochl.
Album: Ovi n. j.
M. f. l. a. Lin: cui pro consist: mel: addi potes plus vel minus farin:

Epithema contra Gangrenam.

℞. Rad: Aristoloch. long:
Gentian
Galangae. aa ℥j.
Herb. Rutae
Scordii.
Salviae.
Absinth:
Meliss.
Serpill. aa Mj.
Sal. Armoniac ℥ij.
Mixt coquant in ▽ simpl. M. ij l. chām in ▽ ✝ vit. postea add: Myrrhae
Aloes aa ℥ß.
♎ Vin: camphorat: ℥iij

Zu dieser laugen werden tücher genetzet, und warm umgeschlagen, darbey müssen innerliche hertzstärkungen und schweiss treib: auch fleissig gebrauchet werden.

Epithem in Gangren:
Ober Kampii

℞. ♎ V. Camphorat: M i.
⊖ ✱ ci ℥ i.
Elixir propr. det al. s.a. ℥ ß V.
M. f. Epithema.

Epithem in humorib. Schirhof: D. D. Stahl

℞. ⊖ ♀ni ℔ ß.
Theriac. ℥ iij.
Camph ℥ ij
♎ Vini ex faecib. M. ij.
M. f. Pill: ex. Aren.

Epithem Dolaei in Gangraena.

℞. ▽ ♃ Viv:
♎ Vini camphorat aa q. v.
Camphor. ℥ ß.
M. et applic: tepide. NB. Dieses Wasser dienet auch zu auswaschung deren wunden.

Pulv. exsiccans in Gangraena.

℞. Pulv. Aristoloch. O. ℥ i.
Cerus: in ▽ ♃ viv: lot et saturat ℥ i ß.
Lapid Calaminar:
Magister: Satur: aa ℥ ß.
Cremor: ♃ viv. ʒ ij.
Camphor. ℈ i.

Myr:

Myrrhæ
Aloes
Euphorbij. aa ℥ij.
M. f. pulv. subtiliss:

Liniment contra Gangren.

℞. Myrrh. pulv:
Aloes. aa ℥j.
Camphor ℥β.
Mell Chelidon:
♎ Theriacal: aa ℥ij.
M. f. liniment: mit welchem post scarificatio=nem loc. gangren. affect: kan bestrichen werden.

▽ Cosmetica Vater.

℞. ☿ij ♎ti ℥j.
▽. Spermat Ranar: M. ij.
Digerant in cucurbita p aliquot dies, deinde fiat Abio lento △e, usq ad siccitatem et serv: us:
Tollit has ▽ serpigines, guttam rosaceam aliaq ulcera si eadem fricant, et abluunt frequenter.

▽ Osa Fallopii.

℞. ☿♎ti vel ☿ti itast mihör ℥j.
Ousti ℥ij
Aq ▽ Rosar.
Sperm: Ranar: aa ℥iv. M.

M. et digerantur loco calido ad solutionem. Ois, ita servetur usui, quae ulcera faucium, aliarumque partium, nec non serpigines, veneris gallicae, maculae ab ulceribus relictae et similes cito abigunt.

▽a ☿ialis mundificans.

℞. ☿ii ℥vi.
▽ plantagin:
Rosar.
flor. Orant: aa ℥iij
M. et coquantur in vitro clauso ad horae quadrantem applicatur tepide c. penniculis imbutis, in faucibus vero cavendum, ne aliquid deglutiatur, indeque exspuendum et gargarismatibus eluendum.

▽ in Vulneribus Sordidis et Antiquis.

℞. ▽ ♆vit. ℔j.
☿ii: dulcis ℥ß.
Sacchar. ♄ni ℥j.
digerantur et coquantur ad solutionem serv. us.

▽ Vulnerar Externa.

℞. Myrrhae Aloes aa q.v.
Coquantur in vino, filtretur et serv. us. Mundificat et Consolidat Vulnera et Ulcera.

▽i exsiccans vi coqin: ☿is

℞. ▽a Ψ viv:
plantag: aa ℥ij
Ol. de Cypr: ℥i
Tutiae ppt ʒijß
☿ii dulc: ʒß.
M. post digest: s. us:

▽ ☿ial: externa in ulceribus malignis et inveteratis.

℞. ▽ Ψ viv. ℥ij.
☿ Sublimat gr. vi.
Terat ☿ig. in mortario lapideo subtilliss: affun-dendo aliquod ▽ Ψ viv: q. s. ad solution: in fine addatur S. V. rectificatissimi ʒij. et f. us: optimum mundificativum est, in ulceribus faucium malignis et inveteratis.

▽a ad Nares obstruct:

℞. ▽a Ψ viv. Majoran: aa ℥ij.
Ω Vini camphorat ℥ß.
M. f. in die Nase zu ziehen.

Unguent: Psylothrum.

℞. Ψ viv. ℥ij
Auripigment ʒvi.
△nis Citrin
⊕ purificat.

Rad

℞. ad Ireos florent. aa ℥ij.

M. f. pulv. loco Rusmatis Turcarum usurpamus l. fiat linimentum cum recenti pulvere adhuc efficatius ex. gr. ℞. pulv. hujus q.v.

Lixiv: fortiss. q.s.

M. et coquant. ad justam consistentiam in olla nova quousq. penna imbuta plumas ammittat hinc addi potest ol. Ligni Rhodi: spic l. aliud odori-feri:

Decoct. Antiscorb: Singulariss:

℞. Rad. Sallapar. ll. ℥IV.

China

Sandel rubr: aa ℥ij.

Coquant. in sufficient. quant. ▽ fontan: l. pluvial ad dimidium horæ spatium, in fin: add. Cinamom. opt. ℥j. decantet. et f. us. NB. loco Rad: Sallapar ll: et China, substitui potest Rad. Lappæ major et cui amara non sunt inimica addi pot. aliquid Herb: Card. Bened: et Absynthii: Decoctum hoc singulare e, et omnibus aliis antepanendum

Liquor Præcipitans l. Stomachicus.

℞. ⊖ ♃ri q.v.

Solvat. in sufficiente quantitate ▽æ fumaria l. Card: Bened: ut fiat lixivium, et servet. pro usu, per se et loco menstrui, pro aliis medicamentis; Est

medic:

medicamentum quoddam Vilissimum, sed magni usus in quibuscunque morbis ab acido oriundis: febribus intermittentibus et Continuis, malo hypocondriaco, Cholera, grumescentia sanguinis &c.
NB. Si per se adhibetur, evaporando redigitur ad consistentiam spissiorem et datur ad ℥i. Circiter pro menstruo vero. Sufficit in dilution forma.

Liquor Censa.

℞. Censa vera ℥i.
Nihil Sicci ℥ß.
Lapid Calaminar
Lithargyrii aa ℥ij.
Tutiæ ppt.
Spodii aa ℥i.
Subtilissim: pulv: et Mixt: affundo. ▽ simp. viv:
plantag:
Rosar aa iij
M. et serv. us: liquor hic optim: Epithem: est in inflamation: articulorum. Lenit dolores medet ophtalmiæ et exiccat oculos continuo lachrymantes, et abigit maculas cutis.

Clyster leniens in tormin: Vent: ab excrem: durities.

℞. Radic: Althea.
Malvæ. aa ℥i. Herb

Herb: Branc ursin:
Parietar
Bismalv: aa Mi.
Flor Chamaem: Mß.
Sem: Foenugraec.
Lini aa ℥ß.
Incis coquant in s. q. ▽ s. vel jusculi carnis Colat.
℞. ℥xii. vel ad ℔j. usq.
add: Chamaem:
Aneth aa ℥iß.
Benedic: laxat: ℥i.
Sal Commun: ʒiii. l. ℥ß.
M. f: Clyst: qui tepid applicand.

NB. ℞. ▽ calid: ℔j.
Salis Communis ℥iß.
M: et appl. loco enemat, e arcanum et infallibile aperitivum paucis notum. V. M. p. 587.

Clyst: in pass: Colic.

℞. Rad: Angelic
Ebuli
Apii aa ℥i.
Flor: Chamaem:
Sambuc:
Melilot
Serpill: aa M. ß.
Sem Foenicul
Anis
Apii

lini.

Sem. Lini aa ℥ij.

Incis et contus coquant. in s. q. ▽ simpl:

℞ Colat. ℔j

Vini Malvat: ℥iv.

Ol. Chamæm:

Aneth aa ℥ij.

Benedict laxativ. ℥i.

Vitell Ovor. n. j.

M. f. Enem.

Clyst: in Strangur:

℞. Ol. Amygdal: dulc:

Lini expr: aa ℔ß.

Mucicag: Sem: Cydon: cum lacte extract:

℥iv.

M. et applicet. tepide.

Remed: Contr: Incintat=on.

℞. Herb. Serant: l. Antirrhini.

Adiant. aurei.

Origani crete:

Corrygæ min:

Rad: Carlin:

Victorial rotund:

Sem: Nigellæ

Rad: Cariophyll.

Morsus

Rad: Morsus Diaboli.
Hb: ex. cum Herb. aa ℥ij.
Incis et contus f. l. a spec bey sich zu tragen, od unter den Schwinten zu graben. ~

Unguentum Contra Ambust. et inflam:

℞. Mell opttim: Virgin ℥ß.
Farin: tritic: ℥j.
Sapon Venet: ℥ß.
Vini adust Cochlear. ij.
Albumen Ovi. No. 1.

M. f: in Mortario Lapideo l. a Unguent serv: usus: [illegible] [illegible] täglich 3 mahl. frisch auf zu legen wenn d inflamation weg und der schaden nicht mehr [illegible] legt man ein gut heilend pflaster auf. ~

[illegible]

℞. [illegible] V. Rectificatiss ℥v.
G. Sandarac:
Therebinth. Venet: aa ℥j.

M. et ponatur in digestione usq ad intimiorem solutionem postea filtretur p. Manicam. H. H. ser. us:

Eine Pomade welche die Hände Weiß und Geschmeidig machet

℞. Amygdal: amar: excorticat et express. ℔i.
Mellis recens Cochlear IV.
Vitel ovor: n. 4.
Sem. papav: alb: opt: contus: ℥ij.
Spermat: Ceti. ℥i.
Camphor. subtiliss: pulv: ℥ß.
M. optime et serveh usui.

Zahn Lattwergen.

℞. Rad. Ireos Florentin.
Sanguin. Draconis.
Corall rubr: aa ℥i.
Moschi gr. IV.
Margarit: oriental. gr. iij.
Syrup de Ros. ℥ß.
Ess. de ros. gutt. xvij.
M. f. Electuarium.

Aliud Electuarium ad Dentes

℞. Corall rubr:
Sanguin Dracon. aa ℥i.
N: Moschat:

Ca

Caryophyll: aa ℥ß.
Cremor ♀ri ℥j.
Pulv. Rad. Pyrethr. ℥j.
Oss: Sepiæ
CC: ust: aa ʒiv.
Ol. dest. Caryophyllor: ℈j.
Mell: Rosar. q.s.
M. f. Electuarium.

Pulv. Contra Flatus.

℞. Bacc. Juniper:
Lauri aa ℥ij.
Semin: 4 Calidor: major: aa ℥j.
M. f. pulv: Divid: in xii. partes æqual: D. S.
5. [illegible] alle Morgen auf einen Theil zu geben, auch den Samen zu extrahieren zu decatieren, und nachdem hernach ein Theil verändern des Morgends von 7. Uhr an biß um 10. Uhr einen [illegible] voll alle Stunden zu trinken

Decoctum in Arthritide.
Probatissimum.

℞. Rad: Salsaparill.
China
Hermodact:

Polij=

Rad: Polypodii aa ℥iv.
Rasur ligni sanct: ℥vi.
Sasafras. ℥ij.

Incis: f[iant] l[ege] a[rtis] species zu 12. Maaß. Wasser und 2. Maaß wein, morgens und deß Nachmittags 6. Uhr dieselbige woll warm, deß übrigen den Tag über kalt, an statt deß biers zu trinken.

Pilulæ contr: flatulent: in Malo hijpocondriaco.

℞. Asæ foetidæ.
Mijrrhæ
Castor.
Opopanac.
Balsam. de Copaijb: aa ℈i.
M. f Pilul ad gr. iv. sumat una mane hora 7. 8. 9. &c. et una supperbibendo, uncia una sequ: Mixturæ.

Mixtura l. Aq[u]a contra flatibus.

℞. Aq[u]æ s. Menthæ. ℥XVIII.
Sijrup. Menthæ ℥ij.
Spirit Menthæ. ℥iij
Essent: Succin. ℥ß...

M.

M. D. S. jedesmahl 2. Löffel voll. alle Stunden. nach einer Stille zu nehmen.

▽ a, ad Cut [illegible] [illegible]:

℞. Herb: Ruth:
Verben:
Euphras:
Endiv:
Beton:
Capill. Ven.
Flor: Rosar: aa M. j.
Ω Vini Gallic: ℥x.
▽ Simpl: ℔x.
M. f. l. a. Destillat:

Pilul. ad Hæmorrh: [illegible]:
[illegible]:

℞. Aloes purificat: ℥x. ij.
Gummi Amoniac. ℥iß.
Mastich: ℥iß.
Guttæ ℥j.
Agaric: ℥v.
Croc. Orient: ℈j.
Θ Abssinthi ℥iß.
Aristoloch: Θ rund: ℥iß.
Succin: ℥vj.
Species Dia 3 or. [illegible] Sant: ℥iß.

Diarhod

Spec: Diarrhod. abbat: ʒ xv.
Styrac Calami ʒiij
M. f. l. a. Massa. –

Sal Polychrest.

℞. ⊕ purificat. ppll:
△ris flaui: pulv:a q. v.
M. f. l. a. detonatio. in Crucibulo ignito. fiat: Massa Calcinet aliquantisper. postea reponat ab igne et refrigefacta solvat in ▽a Calida solut: filtret. evaporet ad pelliculæ apparen: tiam et Crystallisat. in loco frigido est potentissi: mum resolvens et blandum aperitivum prop: terea Cachecticis, et ex haemoptysi phthisi labo: rantibus p cæteris conducit, Dos. a. ʒi. ad ʒvi. in ▽ f. solut: et propinatum.

▽ Vitalis leniens detersiva et Consolidans, interna et externa.

℞. ▽ ♀ viv. Mj.
℥ü viv. ʒj.
M. coquat in vase l. olla.

Electuarium Antihecticum probat:

℞. Pulv. Chin: Chin: ʒvi. [illegible]

Fl: Chamom: vulg: ℥ij.
Caryophyll: ʒj.
Extr: Centauri minor: ℥j.
Roob Sambuc ℥j.
Sulcp. Rosar: ℥ij.
[illegible] Oli gtt. xxxii.
M. f. Electuarium. S. alle 2. biß 3. stunde. einen gutten Messerspitzen voll. zu nehmen.

R.a Saponis.

℞. Sapon: Venet. ℥ij.
🜄. rectificat: ℥viii
R.a [illegible] ℥j.
Ol. Lavendul: ʒj.
Stent in digestione p dies 8. postea decanteh et serveh. usui.

R.a Salitis. n.

℞. ☉ finis. q.v. p. i.
Δ is flav.
Ciner clavellat aa p. iij.
NB. [illegible] und [illegible] muß man in einem [illegible] allein fleißigen laßen, denn es geschloßen [illegible] man doch [illegible] noch dazu.
NB. [illegible] wenn das [illegible] gleich nicht darzu genommen wird, [illegible] es über, [illegible] es nun [illegible].

eine Stunde mit dem ☉ geflossen so schüttet
m. die materia aus, d. legt selbe mit dem
Tiegel in warmen ~~gefäß~~ Wasser und kochet
es rein aus, den was sich von dem ☉ nicht
solviret findet m. unten am boden liegen,
das solvierte präcipitiert m. mit essig so
fällt der 🜍 Ois am [illegible] Schal:
len zu boden, zu weilen doch zu weilen ge:
ring an Farbe, edulcoriere hier auf den 🜍
Ois wohl ein m. bey dem ♁io Diaphoret
zu thun pfleget, wen dieses geschen
und d. 🜍 Ois trocken ist, thut m. ihn in
eine phiole und giesset darauf einen
guten starken rectificierten und hoch
SV. 🜿 sal. 2 a 3. finger hoch, verlutiret
die phiole wohl mit einem gläsernen
eingeriebenen stöpsel, durch ein leder
so mit haaren und manger vermischet,
laß es darauf in warmen Sande wohl
kochen, biß es genug extrahieret ist und
procediere so lange mit auf und abgie=
ßen biß nichts mehr extrahieren will, die
erste extraction ist die beste, und wird
concentriert genennet, wen nun dieses
fertig kan m. 3. a 4 tropf von dem
olo Cariophyl juniperi d. templini dar=
zu thun, da es dan eine veränderung

ein

an geschmack giebet, das niemand er:
kennen kan.
NB. das residuum so in d. phiole bleibet
thun in einen tiegel, und schmeltze es
mit etwas borax. so bekomt m. das gold
wieder.

Anasarca.

℞. Pil. confort ℥iij

\#

℞. Aqua resolvent
Ess. catarrhal aa ℥iij M.

haec optima antihydropica. / ⊖ plantarum c. pilul. hydrop. per mutationem datis

Aphthae infantum.

℞. Ess. pimp. alb. q.p. mel ros. q.p. M.

davon etliche tropfen in einen löffel voll ∇ scabios. gethan, den kindern den mund damit ausgewaschen, auch noch u. nach in salb. flüssigen lassen, zu wechseln wo sich die Aphthae setzen bis in den oesophagum gezogen.

Apoplexia serosa et sanguinea

Praestantissimum remedium est vomitorium / l. clyster stimulans; in sanguinea vero V.S. wobey m. den patient rütteln und schütteln muss.

Arthritis vaga.

℞. Tris temp. 1. ord ℥ß div. in 12 part
℞. Mra resolvens ℥ß.
℞. Pilul Laxant ʒj.

Methodus.

primo 6to. et 12mo die propinetur dos: pilul. diebus vero intermediis mane hora 7. & 10. Mra gtt 30. pomeridie hor 4. & 9. pulvis.

Arthritis hysterica.

vide spasmus arthrico hyst.

Asthma humidum.

℞. ▽. Veron vinos Mj.
Syrup d. Erysim Lobel ℥iij M.
℞. Ess. Asthmat
Mra resolvent. aa ℥j. M.
davon Englisch 5. mahl 30 tropfen

zu ursuum si hoc non sufficiunt VS. inpe de instimando. ~

Asthma Senile. ~

℞. Pil. resolv. ℈j.

℞. Ess. asthmat.
Mᵃ pectoralis aa ʒij M. ~

Methodus.

primo et 2do die 30. 40 gtt. Mᵃ ter porrigant, tertio autem dos. pil.
praestantissimum remedium c̄ ♃ tii curat
ult—— vide ✝ ad congest. ~

Atrophia Infantum. ~

℞. ♃ Olat. l. ⊖ digest ||| ord ʒiij
div. in 9. part.

℞. ⊖nis purg. ||| ord e.gr. pro infante 2. annorum gr. vi et viij.

Methodus.

primo et 8tavo die propinanda dos. ⊖nis purg.
diebus intermediis et sequentibus ♃ Olat ℈j.
in 3. partes aequales divisus quovis die suma-
tur.

℞. pars una nempe hora X matutina altera hora 4. pomeridiana, tertia denique hora IX vespertina.

Cautelæ.

Si æstus vigeat addatur Ori pars tertia it. R. cii interponi pt, quæ præcipue in infantibus adultioribus in fine ter de die sumenda, præscribi potest ubi vero vermes suspicantur et cum atrophia colludunt,

℞. ☉ purg. II. ord ℈j div. in 2. pt. aequales.

℞. R. cii. Ess. Tanacet aa

Methodus.

primo et 4to die dos. una ☉ purg. diebus vero intermediis ter per ○ Ess. pro diversitate subjecti in proportionata dosi exhibeatur.

Auditus difficilis.

℞. Ess. catarrhalis ℥ß.

℞. Pil. ☿ial ʒi

℞. ♁ absorbent citr. ℥ß div in 12 p.

℞. ∽ C.C. ℥i Medull Castor ℈j.
M. f. cum aliquot gtt ♁ Rosar massula diluta auf baumwolln in das ohr zu stecken.

Methodus

Die 1. 5. 10. propinent pilul ℈j. diebg vero intermediis ♁ Ess. gtt. 40 circa somnum denig pulvis.
Alii ∽ serpilli, p fermentationem externe auribg applicant & momentanea opem experiunt!
Massa nostra otalgica eximiam quog opem tulit. ~

B.

Bubones seu Tumor. glandular inguinalium inflamatorius sponte enatg, durus

℞. Pil catar
℞. Mra resolvent
℞. Unguent Paracels
℞. ♁ temp 1. ord ℥ß.

Methodus.

Primo, et 6to die et 12. dos. pilul. diebus intermediis ter p. diem 30 gtt Mra. circa somnum dos. pis. Externe vero loco affecto Empl. um. stomach.

C.

Cacochymia Scorbutica.

Rx. Pil. purg. ℈j.
Rx. Mr resolvent ʒiß

Si gingivarum erosio conjuncta

Rx. Mr ad Stomacac. ℥ß

Methodus

primo 6to et 11mo die dos: pilul. diebus vero intermediis ter l. 4tuor p diem 30 gtt Mα.. Externe vero M ad stomacac, ad gigivas illinandas & abstergendas.

Caries ossium.

℞. Rad. Ari, Aristol ○ pimp. alb a ℥ß
Herb Nicot simpl Mij.
Incis. coq. in ▽ simpl.
℞ Ess. l balf. Stahlii
℞. Ungu. digestiv. 11 ord.
In dieses Decoct wird erst vom Ungu digest u. vom Ess: balsam. gestrichen und damit verbunden.

Convulsivi Motus infantum.

Der innerlichen Jammer der Kinder oder sogenannten Zerbeist.

℞. ○ contra acred. admisceatur aliquot gtt. Ess. dulcis
℞. pilul. confort solv. cum ▽ foenicul.

Loco

Loco pris cont: acred pt sequens.

Rx. [symbol] digest M ord seu Cont acred ʒj.
Lumbr. ▽ [symbol] ℈j.

M. d. in 4 part. et quaevis pars item in tres part. pro infante.

Convulsio hysterica.

Rx. Ess: Millefol. ʒß.
Rx. Ovi depur. [symbol] conch ppt a ℈j
M. de Cynogloss gr. IV. M. d. in tres partes.

Davon alle 2. Stunden ein zu nehmen nach Verbrauchung der ℞. giebt man die Ess. des Tages 3 mahl supposita tamen alvo aperta.

Contractura ex [symbol]ium suppressione à terrore.

Rx. Pil. confort. ʒij.
Rx. Flor Arnicae ß. xii.

Methodus

Methodus.

Primis diebus mane pil. ℈j pro dosi & segg 3bg diebg flor. Arnicæ in forma Thee usurpent et ita continuent.

Cruentatio Gingivarum Infantu

℞. Ess. Succin seu alc.
pimp. alb aa ʒj M. det 3.
per diem

℞. ▽ Salviæ q.p. damit das Zahn fleisch zu waschen.

Crusta lactea...

℞. Ess. catarrh M. resolv. aa ℥ß.
℞. Pilul. catarrh. ℈j d. in 2 part:
℞. Herb. Nicot Mj. Chelidon. Majus
Mß fiat Decot:
℞. Oo ovor q v.

Methodus.

Primo et 6to die pil. intermediis Ess. Caterne locus affectg cum decocto abstergendus

& oleum ovor. illinendus.

D.

Delirium Hystericum

℞. R. ♁ii vitriolat. gr. vj.
Ess. Gent. rubr. ℨij M.

℞ Pilul. confort ℨj.
Extract Helleb. nigr. ℈j M. f. pil.

℞ ♁ Temp. III ord. ℥ß div. in 12 part.

Methodus.

Haec medicamenta alternatim sumunt primo et 2do. die ter Ess. ad gtt 40 & circa vesperam dos. pris, 3tio vero die mane pil. ℈j. et hoc modo continuetur

observatio.

Si mere sit hystericum, Spec. Emenagogae solae delirium removent

Dolor

Dolor Dentium à Carie.

℞. Ess. Succin. seu alc. q. v.
egregium effectum exserit, cum gossipio
in cavitate dentis applicata.

Dentium vacillatio.

℞ Gargar Adsting. Hiss
des Tages ein bis 3 mahl ein Thee
köpflein warm gemacht und gegur-
gelt.

Diarrhoea.

℞. ♁nis contr. Aerec.
Cort Cascarill. aa ʒij. M.
℞. Pilul. confort ℈ij.

Methodus.

quotidie ter p̄ diem pis. versus somnum
vero pil. ℈j. His p̄missis et materia fa-
tis correcta & evacuata.
℞ ♁ sedat ʒij.
sumat quotidie mane et vesperi ℈j.
pro dosi.

observ.

Observatio.

Si spasmi abdominis et intestinorum non remittunt, egregium praestant effectum pil. sedat. cum Ess. stomachica ubi pil. mane et vesperi 1. mane tantum ad gr. V. Ess. vero bis per diem ad 30. gtt. sumenda. Si vero post diarrhoeam alvus adstricta adparet.

Rp. Pil. Polychr. ʒß.

et ne motg iterum concitent.

Rp. Ess. Cort. Cascar. ℥i div. in 2. pt.

früh die helften von denen Pillen und nach mittags 2 mal ... zu nehmen.

Disenteria benigna ex Diarrhoea.

Rp. Pilul. confort: ʒij.

Rp. Ess. Cort. Cascaril. ʒiß

Methodus.

Singulis diebus mane hor. 7. pil. ℈j.

hor. 10. 2. 7. & 10 vespt. dos. pns

Ad dolores in Disenteria vehementiores mitigandos.

℞. G. Arab ℥j. solv. in ▽ quadam
Aqua v gr menta ℥j.
dos: pro uno haustu in einem Thee Schälg

Disenteria Maligna ex febre.

℞. Ess: Alexipharm. ℥ß.
℞. ⊖nis febr. iii. ord
Cort Cascar. aa. ℥ij. M.
Methodus.

Horis matutinis 6. et 10. Ess. gtt 30.
pomeridie vero 2. pres propinent.
Si post diarrhoeam alvus obstructa apparet ℞. Pil Polychr. ℥ß.
et ne motq iterum incitent.
℞. ⊖ Cort. Cascaril; ℥j. div. in 2 pt.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] u.
[illegible] 2 mal [illegible] [illegible]

E.

Epilepsia.

Rx. Pilul. confort
Rx. ♁ Lumbr. ▽str ℥iij
tal lepor ℈i. M. f. pp div. in 12 p
früh und nachmittag die pp und
abends pil. ℈i. wenn aber die Epileps.
nur bey nacht giebt m. früh die
pil.

Epilepsia pertinax.

Rx. Pil. Laxant ℈iv.
Rx. M resolvent ʒß.
Rx. ♁ Lumbr. ▽str. ℥iij. –
tal lepor. M. div. in 12. pp.

Methodus.

Zuerst nimt m. alle Wochen pil
℈i. in den andern 6. Tagen aber

und morgen 30 gtt. M. gegen die 4. phases ☾. oder wenn das subjectum die motus epilepticos werden solte, könte nur ℔ morgens und abends gegeben werden. diese pis können auch in paroxismo gegeben werden.
Einen sehr gewünschten effect thut auch ℥ animale circa phases ☾ zu 30 gtt.

Epilepsia symptomatica ☒ium obstructione

℞. ♂ Temp 1. l. iii. ord
℞ Pil. confort.

Methodus.

Est ut in malo hysterico simplici, qua facta pro ratione circumstantiarum et urgente plethora VS. institui potest.

Erisypelas.

℞. ♂ Temp. 1. l iii ord
externe
℞. Saccul ex farin fabar. Mj.
cerus. camphor a.a ʒj. M.

vel ♁ camphor croc.

Methodus.

Das Pflaster werden 8 ℔ gegeben mit dem ♁ der locus affectus bestrichen und mit dem sacculo bedeckt.

Erisypelas retropulsa.

Rp. ✝ febr. II. ord. ℥ß. div. in 12. pt.
S. Ess. Alexipharm: Stemper.

Methodus.

Mane bis detur Ess. & pomeridie bis ℔

Observatio.

Hic potius incrassantia quam resolventia sunt: exhibenda; hinc ℔ febr: III ord hic ✝ conveniret.

F.

Fauces erosæ ex lue.

℞. Sem. Cydon. ʒß
G. Tragac. ʒij.
℥ii cruḋ. ʒj.
▽. flor. acac. ℥ij. M. f. emulsio
davon alle 3. St. ein Löffel voll warm
zu nehmen.

Febris catarrhalis maligna.

℞. [illegible] febr. III ord. ʒß div. in 12 p.
℞. Ess. Alexiphar. temp. ʒß.

Methodus.

Horis matutinis 6. et 10. Ess. 20–40 gtt.
pomeridianis 4. et 9. dan [illegible] pres.

Observatio.

Si febris acuta transit in lentam [illegible]
loco p. febr. 3 ord. p. febr. 1. ord quia ma
teria submotibus febrilibus jam [illegible] e
nec ulteriore [illegible] p. [illegible] indiget
Quando febris catarrhalis l. cum l. sine ma
culis

alis decedere solet

Cautela circa Methodum

Primis dieb9 usq tertium, ubi sudor adhuc deficit, dch. febr. 2 ord. ter p. diem absq. Ess. sive sudor accedit, Ess. simul propinari potest. ~

Febris cholerica s. biliosa

℞. febr. 2. ord ʒß. div. in 12 pt davon täglich 2. dos. Zu nehmen wann aber keine Fieber dabey sondern nur ein bloßer affectus bilio sus, wird p temp. 2 ord Ungesinben ?? aber die Galle schon in perpheriam corporis getreten wäre dch digest. III ord. welche abloßet und evacuiret.

Febris composita. ~

℞. Absorb. citr. ??ri Blat aa ʒiß
dep. ʒi. M.

℞. Piluf. confort ʒi.

Methodus.

Die anxio ℔ ter ℔ diem, die vacuo vero pil. propinent.

Febris hectica cum tumore [illegible]

℞ ♃ Olat oc [illegible] citr. aa ℥ij. M. d. in 12 part.

℞ Ess. Alexiphar. temp. ℥ß.

Methodus.

Ante meridiem hora 7. et 10. Ess. et post meridiem 2 pres.

Cautela.

Si aestus viget pri ℞scripto addit quarta pars Oni dep. In phthysi autem omittit propter tussim; si autem in phthysi tussis tam vehemens non e comode etiam O conjungi potest.

✱ In affectibus pectoralibus valde urgentibus vero Ess Alexiphar aliqualis pars Ess. Asthmatica admiscet it. Ess. pimp. Cascarill. Vincetoxe &c.

Febris Inflamatoria.

℞ ‡ febr. 2 ord. ℥iiij dio in 9. pat dotton allen 3. Stunden eine zu nehmen. —

Febris Lenta Hysterica.

℞. Pilul. confort. ʒij.
♃ Diat. ʒij.
oc. ♋ citr. Oni dep. aa ʒß.
M. d. in 12 pt.
℞. Ess. Alexiphar. aut Pimp. alb. l. Gent. rub.
Scordii aa ʒij. M.

Methodus

Mane hora 7. et 10. Ess. gtt 30. post meridiem hora 4 et 10. dos. pulveris.

Observatio.

Quando alvus obstructa denturq etiam vespertino tempore pil. ℈j.

Febris Lochialis.

℞. Pilul. confort.
℞. ⊖ febr. 3. ord.

Methodus.

quotidie ter per diem pulveris versus somnum dos. pil.

Febris Quartana.

℞. ♃ Diat. ʒiij d. pro ratione ætatis in

in g. l. 12 part.
℞. Ess. Alexiphar. ℥ß.
℞. Pil. confort ℨi aut si hæ non suffi
ciant ℞. pil. laxant.

Methodus.

Die febrili hora una ante paroxism. et sub
paroxismo l. sub æstu et durante sudore,
dos. pnum primo die vacuo ter p diem
Ess. ad gtt. 30. secundo die vacuo dos. pil.
propinari solet

Cautela.

His pmissis si febris non cessat psenbanth ß.
doses pris ad congestiones, de quibus vero dos.
una ad gr. XII hora ante paroxismum
semp est sumenda; tunc si nondum cessat
Elect. nostr. antifebr. ter, magnitudine Nucis
avelanæ diebus vacuis exhibemus

In febre quartana verse tractata

℞. ♃ Diat. ℥ß.
℞. Ess. Alexipharm. ℥ß.
℞. Pilul. confort ℨij

Methodus.

Diebus vacuis bis de die Ess ad gtt 40. et
vesperi dos. pil. die vero febrili hora una an
te in et post paroxismum dos. pris.

Febris Quotidiana impl.

℞. ♁ris digest. II ord. ℥iij div. in 9. pt
℞. Ess. Alexipharm ℥ß

Methodus.

Mane hora ante paroxysmum pis sub ar:
dere æger multum bibat si adpetitq ad
potulenta adest, post ardorem sub sudore
Ess: gtt 80.

Observatio.

Febre sublata tonicum usurpet v. gr.
℞. Ess. Stomach.
℞. Oli chis Zud. / Ess. gent rub
aa ℥ij. Adde ad XX.
Si pillula confortantes non adversant etiā
conducunt. In infantibq soli pres febri
les III ord. aut mutationis gratia ante
paroxysmum digest. II ord et sub
æstu pres febriles III ord. adhibet.

Febris Quotidiana duplex.

℞. ♁ absorb citr.
♃ni Olat aa ℥iß.

O. depp. ☉ii diaphor.
Conch. ppt aa ℈ij M. d. in 12 pt
℞. Ess. Alexipharm ℥ß.

Methodus.

Hora ante paroxÿsmum dos. pris sub sudo re Ess. gtt. 30. item post sudorem

Febris suppressa.

℞. ☉ digest. II ord. l. digestiv. vegetabile ex Rad. Ari gent rub.
℞. Ess. alexipharm. { ⊖ plantar. aa M. vel Cin. Clavell.
℞. Pil. confort.

Methodus.

quotidie 2 pres et bis Ess. ad gtt 30, versus somnum vero ℈j. pil. umanh.

Febris Tertiana.

Observanda e eadem methodus quæ in febre quotidiana præscripta nisi quod die vacuo Ess. Alexiph. bis l. ter de die ad gtt 30 propinanda sit.

Cautelæ.

Febribq hisce nimis diu durantibq pil. confort. simul subjungi possunt, dant qui dem

quidem in tertiana, die vacuo mane, in quotidiana circa vesperam; ~~exserit cont mane pres~~ si autem paroxysmus sese circa vesperam exserit dant mane pres v. ante et Ess. post paroxysmum.

Observatio.

Infantes raro febre intermittente laborant, Febre hac curata a laxantibus abstinendum est, alias febris nonnunquam recidivit

Febris Tertiana duplex.

℞. ⊖ febr. III. ord ℥ß.
℞. Ess. Alexipharm ℥ß.

Methodus

Quotidie bis pres et Ess. ʒ propinanda sc. una dos. pres 1. et altera in paroxysmo ipso assumat. Ess. v. ad gtt. 30. post aestum qdo jam sudor apparet et deniq post ejus remissionem eadem dosi

Febris Hectica cum Tumore
Abdominis contingens in puella XI. annorum.

℞.

℞. ♃ Olat. ℥iij
lap. ♋. citr. Oⁱ dep. aa ℥j.
M. deh in XV. part.
℞. M. resolv. ℥vj.
℞. Pil. Laxant. ℥ß.

Methodus

Primo et 8vo die dos. una pil. diebus inter
mediis vero et sequentibus antemerid. cis M.
ad gtt. 30. & pomeridianis horis bisque propinet.

In omni febre maligna causa ea biliosa,
singultibus biliosis.

℞. R. bellid. min. liq. ♁ fol. ♃ri aa ℥iij
ℨ Oⁱ dulc ℥ij Oⁱ dep. ℥j.
M. d. S. alle 2 Stund 40 tropfen
propinari potest loco aliarum Alexi pharmac
nam est temperatur, temperata

Observatio.

Si singultus febri supervenerit acutae.
℞. Ess. Alexiph. ℨ Oⁱ dulc aa ℥ij M.
℞. Oⁱs febr. 1. ore. ℥ß.

Externe.

℞. ♁ camph. croc.

Methodus

bis p diem. Ess. et pnis sumant V camph linteo duplicato excepto loco affecto supimponat et hoc aliquoties iteret
Observatio.
Pro certissimo bene curatæ febris habet si adpetitus restitutus et somnus quietus rursus observat. –

Fluor albus benignus.

℞. p febr. III ord. I. temp. II ord ℥ß div. in 12. part.
℞. Pil. confort. ʒij.
℞. Ess. succini sine ☉ ℥j.
Methodus.
Mane pil. ℈j. pomeridie hor 4. & 9. dos. pris. Hisce finitis Ess. ter p diem ad gtt 30–40 propinet. Præmissis hisce, & fluxus nondum cessat Flor Galeops. in forma Thee adhibeant. nota Exempla vide in Jun. Ceri Tab. med. p 768.

Fluor albus malignus.

℞. Pil. Catarrhal. ℈ij

℞.

℞. MR resolv. ℥ß

Methodus.

Primo 2do et tertio die MR ter p. diem ad gtt 30 — 40 quarto autem ℞pil. Dj quinto 6to & 7timo itemm MR ℞ 8vo altera dos. pil. exhibemus.

Observatio.

Quandoq etiam nostri pres resolvent: in usum trahunt; de quibq p 3. dies horis vespertinis versus somnum tempq dos. una ad gr. XII. propinant. quarto vero die mane dant dos. pil. Catarrhal.

G.

Gonagra et Chiragra.

℞. ☉ris temp. 1. ord.

℞. Pil. Laxant.

Externe.

℞. ∀ camphor. croc.

Methodus.

Primo et 4to die dos pil. diebq v. intermediis 3. ☉res p diem sumant, cum ∀ locus affectq aliquoties inungant.

Gonorrhoea venerea.

Primo

Primo exhibent catarrhalia, deinde.

℞. Spec. de Hyacinth.
Croc. ♂ apent. Stahlii aa ʒß
M. d. ad 6. dos. vel.

℞. ⊕ res temp. III ord.
Sedat. aa ʒj M. d in 6 pt

℞. ⊕ temp. I ord. ʒß.
div. in 12 part.

Diesen letztern ist nun temperans welches dem orgasmum sanguinis inhibiret jenes aber nun Sedativum, so den fluxum sistiret. Vormittags wird vom sedativo, nachmittags aber vom temperante genommen.

Observatio.

Gonorrhoea benigna ut et fluor albus benignus ratione curationis sunt tractandi uti maligni; & contra Gonorrhoea maligna cum fluore albo maligno fiunt curando benigni. Hoc tantum de fluore albo ob [illegible] toni qui propter negotium menstruum valde relaxat, valet.

Gonor

Gonorrhoea Maligna.

℞. R. oii ♃ infat. ʒß.
℞. Ess. succin. sine ℞ ʒß.
pimp. alb.
Alexipharm. aa ʒij. M.
℞. Pil. Catarrhs. ℈ij.

Methodus.

Die 1.ᵃ et 6.ᵗᵒ propinent. pil. diebg vero intermediis h. 6. matutina et 4 vespert. hora R. oii ad gtt 30, deniq circa temps dormiendi et hora 10ima matutina Ess. ℞scripta.

NB. Hic opus est ut diuresis cum diaphoresi conjungat. hinc

℞. ♃ Olat ʒiij
Conch ppt ʒi M. d. in 12 pt. vel

℞. ♃ Olat Conch. Citr. aa ʒij.
Cort Cascarill. gr XXXVj.

davon allen Tage(?) [illegible] [illegible] ... Ess. ℞script ... [illegible]

Gonorrhoea Chronica.

℞. Pil. catarrhs. ℈ij.
℞. Spec mundif. 1 ord. l. 11 ord. Mij.

Methodus.

[illegible]

Anfangs und in der mitten die Vollen diebus v. intermediis früh und nachmittags die pcc in forma Thee u. abends bey schlaffen gehen von obgemeldetem pp. Wann es etwas nachlasset so fahret m. mit dem methodo fort und gebraucht statt d. specierum die Mam. Resolvent cum [illegible]

Gonorrhoea pertinax et [illegible] inflammat. eminis [illegible] potest.

Rp. Ess: Succin. [illegible] bene concentr.

Rp Pil. Laxant

Rp. Cris temp. 1 ord. ʒij.
Croc [illegible] aperit ʒij M.

Methodus.

Quolibet die sumantur bis per diem Ess. ad gtt. 40. tempore dormiendi dos. 1. pulv. primo et 6to die [illegible] pil. ~

Gravitas et tremor artuum.

Rp. [illegible] digest 11 ord 1. temp. 1. ord.
M. [illegible] Confort

Methodus.

Quotidie 3. p. et 1. dos. pil. sumantur.

H.

Haemoptÿsis vide de sputo cruento

℞. ⊖ temp. II ord ʒß. d. in 12 p[ulv].
℞. ⊖ temp III ord. ʒß. d. in 12 p[ulv].
Jeden abend zu nehmen, dieser aber zu letzt genommen.

Pro scopo resolvente.

℞. Ess. Pimp. alb. Cascarill aa ʒß.
M. resolv. ʒij. M.
S. des Tages 3. mahl hievon 30 tropfen.

Haemorrhagia uteri vide [illegible]

Haemorrhoides coecae.

℞. Pil. Confect.
℞. ⊖ pres temp. I ord l. in Ess Alexipharm
des tages 3. mahl ℔ abends pil. ij

Externe ad dolores mitigandos

℞. Axung. Anguill.
℞. ⊖ muris marin l. Exuv. anguill.
vermittelst einer Nacht Stuhl die Haemorrhoides zu räuchern.

In serpigine haemorrhoidali

Pro renali V.S. commendat, interne quae in haemorrhoidib. caecis applicant, adhibenda sit: externe etiam ℞ mur. mar. et axung. anguillae conducunt. Prinis tri: hisce optime praestat sequens.
℞. Mucilag. sem. psyll.
Cydon.
foenugr. aa ℥ß.
Mastich. camphor. aa ℈j.
M. f. unguentum, drum locum affecti Täglich ein paar mahl damit zu bestreichen.

Haemorrhoides internae cum malo Hypocondriaco.

℞. Pil. confort. ℈iv.
Extract. Helleb. n. cent. min. aa ℈j
M. f. l. a. pil. pond. gr. i.
℞. Elixir ℥j.
Propinant praevia V.S.one ter ℞ diem gtt. 30. et vesperi pilularum ℈j.

In tenesmo Haemorrhoidali

℞. Ess. catarrh. Millefol. aa ℥ij
M. det. ter ℞ diem ad gtt. 40.

Hemicrania.

℞. Tinct. temp. 1 ord. larg. Brat. ℥ß.
℞. ℣ Camphorat. croc. ℥j.
Quotidie 4 pres deinde externe v. ℣ ad: plicet.

Hernia Crotalis.

℞. Ol. Verbasc. lini lilior. alb. aa ℥ij
Camphor. ℥j. M.

Hypochondria cum nature tractari ut Hystericum.

Hypochondriaca angustia.

℞. Ess. asthmatica ℥j.
M. resolv. ℥ß M.
℞. Diss. catarrh. ℥j.
℞. Tinct. absorb. citr.
♃ Clat. aa ℥iß M. d. in g. pt.

Methodus

Die 1º) 2do et 3zmo. semp. pil. ℈j. sumat diebq. v. intermediis ter per diem Ess. gtt. 4c, vespere deniq. circa dormiendi tempus dos. unus.
NB. pro re nata etiam V.S. in pede ab initio insti[tu]i debet.

Hæmorrhagia Uteri abortiva.

℞. Pil. confort. ℥ij.
℞. Spec. d. hyacinth. ʒß.
Corall. rubr. ppt. ℈j.
Pil. de Cynogl. gr. viij M. d. in 6 pt.

Methodus.

Propinantur mane pres et vesperi pila 1. mane pil. et vesperi ℞. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ℞.

Hæmorrhagia Uteri c. coagulatione sanguinis conjuncta.

℞. Pil. confort. ℈j.
℞. [illegible] febr. III ord. ℥ij
℞. [illegible] sedat. ℈j.

Methodus.

Assumuntur mane pil. ℈j h. mat. 11. et pomerid. 4ta dosi ℞ febr. cir. somnum vero ℞ sedat. ℈j. vel.
℞. [illegible] temp. 1 ord.
Sedat. aa ℥ij. M. d. in 12 pt.

℞. Pil. confort. ℈iv.
Quorum tres p. p. diem vesperi vero pilul.
propinant: Pulvis hic dat. cum fructu
ad motus nimios compescendos, Pilulæ ve
ro Uterum ab impuritatibus quas natura
his motibus, quibus major Sanguinis appul
sus versus hunc locum excitat, expur:
gare conat., liberant.

Hysterica Passio Simplex.

℞. ♁ temp. 1. ord. ℥ß d. in 12 pt.
℞. Pilul. confort. ℈ij.

Methodus.

Hæc medicamenta ad 6. dies sumenda
p. aliquot dies ante et post ☒ium erup
tionem usurpent. bis p. diem sc: hora ma
tutina 10. et pomeridiana 5. p. una dosi
vespertino vero tempore circ. somnum
pil. ℈j. sumendus in spinaci ob infarct.
mucidos conducat interpositis laxat. p. resolv.
pro cor: gr. ij.

Hysterici mot. exacerbati.

℞. Pilul. confort. ℈ij.
Extr. Helleb. n. ℈j M. f. pil pond. gr. j.
℞. ... ... ℥vj.
Ess.

Ess: gentian rub. ℥ij M.

℞. ✝ris Lumbr. ♁str. ℥ij.
Talor. lepor. ✝ris ℈ii aa ℥j.
M. D. in 12 pt.

Methodus.

Mane et pomeridie h. 4. Ess. gtt 40. hora v. 10. matutina et vespertina 9. pris una dos. sumat. His p duos dies propinatis tertio die pil. ℈j usurpet.

Hysterica Passio ab Haemorrhoidibus caecis.

℞. ✝ temp 1. ord. ℥ß.
℞. Florb. Millefol.

Methodus.

Pulvis quater de die sumat et de Herba bis p diem in forma Thee bibat ad Cessationem usq dolorum.

Hysterica Passio c. Hemicrania.

℞. ✝ temp. III. ord ℥ß d. in 12 pt.
℞. Ess. Laxant ℥ij.

Syrup.

Syrup. Rosar. sol. ℥ß M.
Methodus.

Tres dies ante et totidem post adhibit laxans usurpent pres.

-Hysterica passis cum delirio. vide Delirium hyster.

-Hysterico arthritici spasmi vide spasmus hystericus.

-Hysterica Convulsiones vid. suo nomine convul. hysterica.

-Hydrops.

I.

Icterus.

℞. Pil. Confort. ℥iij
℞. ☿ Olat ℥ij
Oc ♋ citr. ⊕ dep. aa ʒi.
M. d. in 12 pt.

Methodus.

Singulis diebus mane dos. pilul. pomeridie h. 4. et vesp. 10. dos. pns. Si his premissis Icterus cedere recusat, loco pulv. praescripti, sequens cum pil. confort ordinari debet.
℞. ⊖ rad. Curcum ℥iij
☿ Olat ℥ij. M. d. in 15. pt.
Praemissis generalioribus subjungi possunt circa vesperam ad colore flavum in cute profligandum seq.
℞. Ess. Alexipharm
℞. ♃ Oii diaphor
℞ absorbentes aa
Ictero curato ad tonum roborandum sequens Ess. Conducit.

℞.

℞. R. ʒ aq[u]. Lud. Ess gent. rubr.
Ess cort citr. aa ℈ M.
cum M tonico-nervina Stahlii
d. ad XV.

Infarctus Hepatis.

℞. M. resolv. ℥ß.
℞. pilul. confort ʒij.

Methodus.

Ter p. diem M, versus noctem pil. no.
15. — 18. sumant.

Externe

℞. Empl. de Melilot Camphor
℞. Empl. Norinberg. camphor.
Alterum horum sc emolliens Empl.
vespori alterum discutiens mane applicetur

Infarctus Lienis.

℞. ♃ Olat.
℞. pil. confort.
℞. M resolv.

Methodus.

Mane bis M gtt 30. pomeridie bis pil
℈i. et circ. somnum pil. ℈i.

Ischiadicum Malum

℞. Pil. confort. ℥iij.
℞. Mixt. resolv. ℥j.
℞. ∇ camphor. croc. ℥j.

Methodus.

Quotidie ter p. diem Mixt. gtt. 30. versus somnu. dos. pil. et externe locus affectus ∇. camphor. illinatur.

L.

Lipothymia

℞. Pil. confort. ℥iij
℞. pulv. febr. III ord. ℥iij
Spec. de hyacinth. ℥j. M. d. in 2 pl.

Methodus

Bis de die propinentur pil. nº 15. manesc. et vespers; h. 10. ante et post meridiem dos. pulv.

M.

M.

Mensium Emansio.

In plethoricis, cholericis et orgasticis obsessq quovis mense per 6. ultimos dies ante Noviluniu. Pil. Confort. et pres antispasmod. l. temp. 1. ord. adhibeantur, et secundo mense V.S. in pede administretur. In Melancholicis phlegmaticis et mucidis manet eadem methodus sed loco pulveris dentur per 6. R. dii ad gtt. 40. cum sufficienti vehiculo.

Mensium Obstructio.

℞. Pil. Confort. ℈ij.
℞. pulveris temp. 1 ord. ℨß div. in 12 pt.

Methodus.

Singulis diebus propinatur h. ante merid 10. et pomerid 4. dos. per vespere v. circ somni tempus pil. ℈j. instituenda autem haec medicatio circa hoc tempus, quo menses exspectandae essent. Mensibus non succedentibus repetuntur eadem medicamenta altero mense, si fluxus non appareat praescribitur Thee Emmenagogum aut sequens decoctum

℞.

℞. Rad Bryon Caryophyll. aa ʒiß
Hb. Card ben. Inf. fibr. artemis aa M, ß
Fl. Calendul. p IV.
Cent. min.
Fibr. Hellebor. nigr.
Fol. Sen. s. stip. aa ʒij
Crem ♃ri ʒiß.
Incis. d. s. Species cum ▽ simplici et di
midia altera parte vino, Wein Thee zu
trinken bis p diem. Fruitis his omnibg
stimulans quadam adhiberi pt. ut Ess.
laxans l. purgans v.gr.
℞. Ess. Myrrhae ʒij.
Croci ʒj M.
S. Ter p diem gtt 30. –

Cautelae

Omnia haec medicamenta semp aliquot
dies ante eruptionis tempo propinend,
qdo nempe dolores sentiantu in regione
lumbis et ossis sacri. Quando dolores
justo vehementiores st: decoctum mil:
lefol. aliquoties usurpari potest.
Plebeis paulo fortiora purgantia exhi
beri possunt, evacuando sc. p pil

Catar.

catarrhales et MR resolventem ita ut 1. et 6to die pil catarrhal. diebus intermediis v. MR. bis per diem propinentur.

Mensium Obstructio.
cum Haemorrhoidibus.

Rp. ℥ temp. III ord ℥iij d. in 12 pt.
Rp. Spec Emenagog. | MIV.

Externe.

Rp. Axungiam et Exuviam Anguil.

Methodus.

Singulis diebus h. antemeridiem 10. et pomerid. 4. nec non vesp. 9. pil. ij. bis vero per diem infusum Spec Emenagog Callide tanquam thee usurpari potest. Axungia locus affectus illinatur Exuvia vero supimponitur et fumus genitalibus in sedili excipitur.

Mensium Cessatio.

Rp. Pil. confort ℥ij.
Rp. MR. resolv. ℥j.

Methodus.

Mane dos. pilul. et ter de die Ess. ad gtt 90 propinentur. Pro re nata in Plethoricis etiam V.S. in pede Commendanda.

Mictus Cruentus.

℞. pulv. temp. 1 dr.
℞. Rad. Asparagi ℥iv. fiat c. gr. m. d. ad Chart.
Methodus.
quotidie 4 pres assumant et bis de
Rad. in forma Thee bibat.
NB. versus somnum quotidie dos. pulv. Seoat
loco temp. adhiberi potest.

Morbilli vid. Variola p.

Motus ad vomitum Cruentum.

℞. Ess. Millefol. Cascarill. aa M.
dal.... ... ... 2 mass. 30–40 ...
...

N.

Nephritis.

Rx. ♃ Blat. ⊖ dep. ℈ ppt aa ʒij. vel
Rx. ♂ temp. 1 ord. ʒß d. in 12 pt.
davon täglich 4 ʒß zu nehmen.

O.

Oculorum Pannus seu Panniculus.

Rx. ß testor. ovor. ⊕ nat ʒij.
ʒß ri Canar. q. v. ppt. subtiliss. vel lap.
hsil: subtiliss. ppat. mit einem feder
kiel des tages etl. mal in die
augen geblasen.

Oculorum affluxus serosus.

℞. Pil. catarrhal.
℞. Ess. catarrhal. M. resolv. aa
℞. ▽ ophthalm.

Methodus.

Prime et 6to die pil. diebus interme
diis M. ter p. diem, externe vero ▽.
Ophthalmica ter v. 4ter de die aliquott
gtt. imittitur.

Oppletio pectoris muci a Infantum.

℞. Syrup Cichor cum. Rhabarb.
Oxymel Squillit aa.

Methodus.

Infanti aliquot hebdomadarum praescribit
ad ʒij. infanti 4 annorum ʒvj.
dein ejus dimidia pars, q. si uno vel
altero praestat effectum 3tio die alte
ra dosi jam minus, statim post aliq. uot
horas exhibetur.

P.

Paralysis Ordinaria.

℞. Pil. Confort. ℥iij.
℞. Flor. Arnicæ p. XII.

Methodus.

Hæc medicamenta alternatim sumantur nempe primis 3. diebus mane pil. sequ. 3. diebus flor in forma Thee sumendo et semper p. 1. ad ∇æ ℔j.

Observatio.

Mulier Paralysi tacta adhibitis et præmissis omnibus reliquis medicamentis accepit singulis diebus circ. vesperam Pilul. No. 24. seq.

℞. Pil. Confort. ℥ij.
pulvis Mastichi ℈ij.
Corall. rubr. ppt.
Croc. ♂ aperit. aa ʒß.
M. f. Pil. ad pond gr. I.

Janique ℈ animale accepit. Hic Ess. dulc. Hallens. egregium quoque præstat effectum
* In affectu Paralytico eadem medicamenta jam jam descripta et eadem

methodo adhibenda. In specie mulier post partum affectu paralytica correpta accepit segq.

℞. Oris febrit. ℳ ord. ℥ß.
℞. lumbr. terr. formic. serpill. abstract aa ℥ß. Camphor. ʒij.

Methodus.

Mane pil. tart. [illegible] c [illegible] dosis adsumat cum [illegible] externas lavat partes

Paralysis Linguae.

℞. [illegible] formicar. serpill. abstract aa ʒij
Ess. castor. succin. aa ℥ß.
[illegible] lavend. Major. aa ℈ij
M. d. s. [illegible]

Paraphimosis.

℞. Pil. catarrhal.
[illegible] Ess. catarrhal. vel M. resolvent.

Externe.

℞. Sacul. discut.

Methodus.

pri

Primo & 4to die. dos. pil. Diebq vero inter medijs Ess. ter de die ad gtt. 30. assumant. Quando autem urgente complicata Gonorrhoea versus somnum dos. pils temp. loco Essent sumere licet. Species vero resolv. et discut. in lacte coquant et in hoc decocto calido p semihoram penis inmergat, postea sacul. discutientes diu noctuq imponant. quoties vero praeputium in lacte fovet, toties tentandum an cum vehementia quadam sup glandem protrahi possit, sin minus incisio levis instituat ob metu gangraena. —

Paraphimosis Tumor.

Rx. Piluls. laxant l. Catarrhal. ℈j.
Sp. p resolv. Conch. Citr. aa ℥iij M.d in XXX pt. vel.
Rx. Rad Pimp. alb.
Hb. Saponar. Inc. cont det ad Chart:

Methodus.

Specierum Mj coquant in ▽a t[illegible] adhibeat vel pro potu ordinario l. loco Thee.

porro

porro propinet primo laxans diebus v. sequens vesperi semper pris dos. 1. locus affectus regimine calido tractandus

Partus difficilis.

℞. Borracis Venet gr. XV.
pris hepp. Angili ℈j.
~~fact nostr. gr XV.~~
oo Cinamomi gtt ii.
M. d. in 2 pt seu allen 2 Stunden 1 Zunum

Methodus.

Datur 1. una dosi, post referationem vero orificii interni uteri exhibeatur altera in vino calido.

Observatio.

Interdum post primam dosin excluditur foetus, interdum post alteram aliquando plures requiruntur.

Perniones.

℞. oo Terebinth l. petr.
in exulcerationibus vero oo ovor. l. cera, hij

hÿperici pappÿri, præstantissimum e oo Mÿrrhae p. d. ~

Pectoris affectus valde urgens.

℞. Ess. Alexipharm. cui aliqualis pars Ess. Asthm. admisceat item Ess. pimp. Castanil. Vincet.

Pectoris oppletio infantum mucidu

vide oppletio. ~

Phthisis. ~

℞. ⊖ digest. II ord.
℞. Pilul. Confort.
℞. Spec. Paracelsi Corr. quae ter p diem in forma Thee sumantur vel.
℞. ▽. Veronic. vinos. bibatur bis p diem ad ℥i – ℥ij.

Methodus.

Singulis diebus ter per diem h. 10. vers. pres sumatur. versus somnum pil. spec. vero aut ▽ mane et pomendie h. 2. propinatur item Decoct. Traumaticum paracels. In statu pletorico VS. locum habet

bet. partibus internis adhuc illæsis sæpissime egregium exserunt effectum seqq.

℞. Rad Cichor. Tarax aa ℥ij.
Gram liquirit aa ℥j.
Herb Vetonic. Teucrifol. Mij
Sem anisi. fœnic. aa ℥ß Conc: cont:
dez harum spec ß. 1. coq. in ▽ ℔j. bibat
ter p d cum lacte

pleuritis tractatur ut alia
febris inflammatoria.

Si punctura ægrotum valde cruciant
concencat. ℞. Sem. Card. Mar gr. IX.
contus. dez.

Procidentia ani et sphincteris paraly
tica.

℞. ôris Mastich ℥j.
auf den Vorfall zu streuen und
dass Intestinum mit warmen Tüchern
zu reponieren; his initis pessus à
à Bassio descriptus applicet.
Interne.

. ℞.

℞. Pulv. contr. acredinem ʒß.
℞. Ra tii ♃ sat ʒß.
alternatim ad hibeant bis p diem ad demul-
cendam materiam acrem.

Prolapsus Uteri.

℞. Cort. Granat. Nuc. persic.
Pomor. Gallor. aa ℥ß.
Incis. cont: coquant in ▽ ferrariâ p semi-
horium, filtratoq adde Onis ℥ij. Humecten-
tur lintea duplicata in hac ▽ calefacta et
ter p diem vaginæ Uteri immittant.
Præterea fumus ex stercore Columbino, carbo-
nibq ignitis imposito ter de ♂ inferioribq
corporis partibq excipiat.
Interne ℞. p temp. 1 ord. ℥ß.
℞. R. tii ♃ sal. ℥iij
CC. ℥ij. et.
Primo pres p singula trihoria his conjunctis
propinant Ess. gtt. 40 ter p diem.

Observatio.

Venelect: in pede ante omnia comendan-
da, t. s. omnibq his adhibitis cedere nolit

pessario, in loco detinendus sue.

Prolapsus Vaginæ Uteri.

Eadem methodo ut procidentia ani tractanda venit.

Purpura Alba et Rubra.

Rx. ♁ febr. II ord. vel
Rx. Oc. ♋ ppt et citr. aa ʒij.
⊖ depur. ʒi. M. d. in 9. pt:

Methodus.

Singulis 2. l 3 horis dos. pulvis sumatur. Postea lapso morbo et superatis exanthematibus Ess. Alexipharm. ter per diem ad gtt 30. praescribi potest.

Purpura pellucida.

Est efflorescentia cutanea instar pustularum inflamatoriarum quæ abdomen in forma pellucida circumdat et maxime ardorem causat. Conducunt in specie lenia temperantia l. potiunculæ temperantes cum diatis verò mixtæ ut et pres

temp. 1 ord. singulis bi horis sumendis

R.

Rheumatismus seu congestio incompleta.

Rp. Pil. Laxant. l. p. purgant.
Rp. Mixt. resolv. l. Ess. Alexipharm temp.
Rp. Sacc. discutient.

Methodus.

primo et 4. die dos. purgans, diebus intermediis Ess. ter p diem ad 30. gtt. commendant. Externe vero sacc. discut. cali de loco affecto applicant, si spasmum in loco affecto urgent, p temp. continuari potest.

S.

Scabies.

℞ Pil. Catarrhal. ℈ij d. in 2 pt.
℞ Mix. resolv. ℥ß. I.
℞ Ess: catarrhal. succin. aa ʒij M.
℞ Conchar. citr. ʒiij d. in 9. pt.

Methodus.

Primo et 4to die pil. ℈j. diebus intermediis Mx. I. Ess. ter p diem ad gtt. 30-40 singulis vero diebus vespertinis horis dosis p usurpat. :Cautela.

In affectibus aurium quod aliquando concurrit Ess. succini sine ☉ pplta

Si vitium subest primarum viarum Ess: gent. rubr. I. alia stomach: dat.
In affectibus pectoris Ess. Pimp. com. cat. His rite adhibitis loco Rra Spec pro Thee usuales prsenbunt. ~

Scabies pertinax. ~

Adhibitis in antecedente pplis.

℞. Ungu: Siale. vel.
℞. Alb. Nicot Mij.
fricf. fiat cum ▽ decoctio qua lavant partes adfectæ, tunc.
℞. Oo olivar. l. Oo rosarū ℥j. quo partes post lavationem cum decocto ungi potest.

Scabies retropulsa:

℞. Ess. Catarrhal. & pimp aa ℥ß.
℞. Pilul. Catarrhal. ℥ß.
℞. ⊖ febr. m crd. ℥ß. vel.
℞. pris Contra acido ℥iij.
♀ flor. ♃ris gr. XX. M. d. in 12. p.

Methodus

Primo ⊖ dimidia et 2do reliqua pars pil. diebus vero intermediis hora ante meridiem bis Ess. horis v. pomerid. pres bis dant.

Observatio.

Ordinarie Ess omittit quovis die bis p. se. una dos. mane et altera 2. horas post coenam, ante cubitum nempe. eundo sumit.
Conf. Tab. med p. 7.46. no. 8.

Ser. 30.

Singultg. febri supveniens acutæ vid. febr. maligna.

Soda seu ardor Ventriculi.

Rp. Nucleos Amygdal. excort No. IV. et comede spasmus in dorso a congestione sanguinea vulgo [illegible]
Rp. pris temp. 1. [illegible]
Externe Rp. V camphor croc. qui loco affecto linteis duplicatis appliciz

Spasmus Asthmatico hysterica.

Rp. MR resolv. [illegible]
Rp. Pil. ~~[illegible]~~ catarrhal. [illegible]

Methodus.

Primo et 2do die bis Mr ad gtt. 30—40
tertia v. dos. pil. stis praemissis
Rp. p temp. II ord.
Rp. Mr. resolv.
Rp. Pil. Laxant.

Methodus.

Primo secundo 3tio die mane bis 30 gtt.
Mra pomeridianis horis 4 et 10. p̶ res
exhibentur, die 4to vero pil.

Scorbutus Cruentus

Rp. Ons temp. II ord ℥ß.
D. in XII ptes quotidie IV. sumendi

T.

Tenesmus Simplex.

℞. pris temp. II ord.
℞. Pil. confort.

Methodus.

Singulis diebus 0. pres et versus somnu
dos. pil.

Tenesmus Haemorrhoidalis.

℞. Ess. catarrhal. ℨi. Millefol. ℨi-ℨij.
M. d. ter p diem ad gtt-40.

Tumor Parotidu vid. parotis.

Tumor Glandularum inguinalium inflamatorius sponte enatq durus.

℞. Pil. catarrhal. ℨi.
℞. M. resolv. ℨi.
℞. Unguent Paracels

℞.

℞. pp temp. 1 ord. ʒß.

Methodus.

Primo 6to et 12mo. die dos. pil. dieb. intermediis ter. p. diem M. gtt. 30. Circa somnum dos. pris v. loco affecto Empl. imponat.

Tussis ordinaria.

℞. Pil. Catarrhal. ℈j. vel
℞. Ess. Laxant. ʒij.
℞. M. Pectoral. l. Ess. Alexiph. ʒß.

Methodus.

Primo die mane pil. dieb. seqq. ter per diem Ess. ad gtt. 30—40. his adhibitis et tussis non cessat seqq. dant.

℞. Ess. Stomach. ʒiß.
Extract. Nicot. ppp. ʒß. M.
ter per diem ad gtt. 30.—40 sumenda
vel. ℞. Extract. Nicot. gr. XIV.
f. l. a. pil. pro una dos. vel
℞. pris ad Congest. gr. XXXVj. det. in 3. partes de quib. mane dos. sumenda e

Cautela

Si Extracti Tabaci conatum vomiendi causat, propinet vinum calidum aromatisatum vel gr. Cinamomo.

Tussis Catarrhalis.

℞. Pil. resolvent ℈j.
℞. Ess. Asthmat. Mk resolv. ad ℥ij.

Methodus.

Primo 2do et 3tio die Ess. ter p diem ad gtt 30 – 40 . quarto die dos pil sumat

Tussis Pectoralis.

℞. p digest U ord ℥ijß.
℞. pil. laxant ℈j.
℞. Specier. Paracels. Corr Mij.

Methodus.

Primis tribus diebus bis p diem scil. hora 10. matutina et 9 vespertina pres et hora 7. mat et 3. pomerid spec in forma Thee adhibeant. quarto vero die dos. pil. sumat.

Tussis Stomachalis.

℞. Ess. Gent. r. C. B. Cascar. aa ℥ij M.
℞. pris digest. 1 ord. ℥ß.

Methodus.

Singulis diebus horis matutinis bis Ess. ad gtt 30. Horis vero pomeridianis ℥&9. pres propinentur.

Tussis infantum.

℞. Syrup rosar. solutiv. ℥j.
Ol. Amygd. dulc. ⊖ depur. aa ℥ß M.
Ter p diem ad cochleare sumatur vel
℞. Oxymel. Squill.
Syrup. de Cichor. cum Rhabarb.
aa ℥ß.

M. d. dimidia ejus pars, si non statim edit effectum altera dosis exhibeatur alias seria die demum propinanda.

V.

Variola et Morbilli.

Ess: pris cont: acred.
singulis tri horis pro diversitate ætatis dosis propinatur; si alvus non respondeat pri pil. confort. aut integræ aut solut in ▽ foenicul. præscribantur.

observatio.

Si Aphtæ l. faucium inflamatio urgent commendatur Ess. Pimp. alba cum melle rosar. remixta, quo os inungatur penicillo Superato morbo prima vice cum pre purg. II ord. sæpius leniter expurgantur et quotidie Ess Alexipharm sumitur

* In retrocessione Variolarum

Ess. Alexipharm Stahali refractis sæpe repetitis vicibus exhibeatur. Cæterum durante morbo conveniens regimen observetur

Vermes Infantum.

℞ ♁ris purg. II ord gr. XXIV. div in 2 pt.
℞ ♃ri Olat ℨij. M. d. in vj pt.

Pro Adulto.

℞ Pil. Catarrhal. ℈ij.
℞ Ess. Stomach. Tanacet aa ℨij.
M. d. vel.
℞ Ess. Gentian rubr.
Tanacet aa ℨij. M. d.

Methodus.

Quarto et 8vo die infanti una dos. ♁ purg. Adulto dos. Pil. Catarrhal. diebus antecedentibus et intermediis ter de die infanti ♃l. Olat. Adulto vero Ess. dati.

Observatio.

Interdum etiam adultioribus pro digest. et infantibus haec Ess. praescribi potest.

II.

Ulcera cacoethea et phagedaenica.

℞. Rad. Vincetox: Pimp. alb. aa ℥ij
Hb. Saponar. M viij.
Incis. dch. ad Chart.
℞. Empl. Sapon. Barbette camph. ℥j
℞. ℞ resolvent. ℥iij d. in XV. pt.
℞. Pil. catarrhal. ℈j.

Methodus.

Die 6to 12mo. et 18vo Pil. singulis diebus intermediis vespere propinet. ℞ de speciebus v. bis p. diem calide bibat.

Motus ad vomitum cmen tium.

℞. Ess. Millefol. Cascarill. aa qu. mij. ter p. diem ad gtt. 30.—40.

+ Hüneren wider dass Sihnen
gehört einem grossen Stück
bei il braunen wollen uns ohe zu
legen od zu thuon

℞ ⊖ Alis C.C. ℈ij
medull. Castor elect. ℈ß.
M: f. ⊖ d. ad vitr. probe obturat S. +

1.) Pulveres.

No. 1.) ♁ Laxans 1. ord.

℞. △ ♁. ⊙ ult. ═══onis
🜔 Plat
Conch ppt aa gr. vj. M. pro dosi adulti.
In mucidis opplelionibus pectoris, asthma catarrho suffocativo, quia tantum per vomitum excient affectum hic adduntur conchae, ut non solum mucida biliosa sed et acria pp. rent.

quae 🜄 aurato evacuanda.

2.) Laxans II. ord.

Rx. Scam: 🜄
☿ii dulc aa gr. VI.
Conch ppt ʒß M. d pro dos.

hic ☿ dulc superat ordinariam dosin hinc non saepius iterandum sed p dies aliquot cessh. Est pulv. bey kindern zu gebrauchen das m. kann nicht besseres wünschen als dieses

3.) Resolvens.

Rx. ☿ dulc gr. ij. bey erwachsen iij
Conch: ppt ʒß M. pro dos

dieses ist ein ganz besonderes pulv. und ist keines zu vergleichen welches die alten stärken [illegible] und [illegible] [illegible]
ul

ulcera, e mirificum remedium dis tubercula scirrhi, und andern der gleichen mehr zu curieren.

4.) Ö Laxans pro Infantibus

℞. Ras. Jalapp. gr. vj. terantur cum cum amygdal. dulcib. adde Rad. liquirit. pp. gr. vj. Ol. anisi gtt. ij. M. opt. div. in iiii part. Est usitalis familiæ regiæ Berolinensi, resina e disconhinuata hinc non movet tormina: sed infanti infra anu non propinatur sed à 2 — 6. versus somnum, et quando nil efficit, mane altera dosis exhibetur.

5.) Ö Febrilis 1. ord. in febrib. intermittentib. præcipue quartanis

Sunt febres ubi nulla acria biliosa occurrunt hinc ö opus e absorbentib. ℞.

℞. ♃ni Olat. ʒj.
⊖is plant.
Ocul. canc. citrat. aa ʒß M.

6.) ♁ febr. II ord. in acutis benignis et intermittentibus gastricis

℞. ♃ Olat.
Conch. citr. aa ʒß.
⊕ depur.
♁ diaphor. aa ʒij. M.

7.) ♁ febr. III ord. in acutis malignis hic ⊖ mediu omittendu

℞. ♁ diaphor.
Matr. perl. ppt.
Conch. citr.
⊕ depur. aa ʒß
[illegible] opt. ʒj. M. f. dent. ad chartam, dem dosi von drüssen 3. [illegible]

In malignis materia Alkalica agitio res biliosa quæ involvenda et absorbenda, hinc non opg ⊖ medii.

8.) ⊖ ad Partum.

℞ Hep. Anguill. ʒß
Borac Venet
℥ opt. aa gr. V. M. pro dos.
observ. ut Hep. Anguillæ annu non superet. sed sæpius recens.

9.) ⊖ Moderans alias secundinas sed quia dictis suspecty quivis.

℞ Corall: rubr. ppt
Cascarill. ppt aa ʒi
Spec de Hyacinth.
℥ opt. aa ʒß.
℞ de Cynogloss. ʒß. M. opt
div. in X part: In omnibg doloribg exacerbatis, excretionibg nimiis superfluis abundantibg, interdu sequens melius

10.) ♁ sistens et tonicus in diarrhoeis, dysentericis, in atoni ventriculi flaccida. ~

℞. ♁ cascarill ʒj.
Crystall mont. pp ℈j.
Croci ♂tis aperit. Stahl.
℥. M. pp aa ℈ß. M. div in V partes. ℥. M. corrigit saporem cascarillæ ingratum.

Pulv. temp. l. antispasmodicus

Observ. Interdum dolores peccant, ubi necesse e ut ♁ ingrediatur, licet ♁ per se sine aliis medicamentis. minime antispasm: virtutem exserat, tamen in sta cotis subtilia
in aliis peccant acria ♃ biliosa in his non indigemus ♁ hinc loco ejus addimus antacidum antibiliosum ante salinum, hoc e absorb. citr.

in aliis requirit ut hi p continuent, ubi tonico opus e ut in substantia Cascarillam addamus, dolendum tame de ingrato illius sapore. ad Cascarilla Extrahenda pstat vinum prae ▽.

11.) ☉ Temp. 1. ord.

Rs. ♃ Plat 1. quodcunq Remedio ☉ depur. aa gr. Viij.
opt. gr. ij–iij–1. iv. M.
interdum augeti dosis in exacerbatibg doloribg sic v.g. hujus p Gij. ʒi: M. sic dicit largiter liberatus.

12) ☉ Temp: 11 ord. alias aliog ob defect

Rs. ☉ depur
♃ Plat
Conch ppt aa ʒi M.
conducit in affectibg biliosis, orgasticis humorum conditionibg. obsev.

observ. Si ⊙ absorbente propinat, hu
mores incrassant, ♀ Olat vero resolv
interdum materia biliosa jam coagula
ta invenit, quam ♀ Olat resolvit;
sic in hoemorrhagiis, v gr. hoemoptisi
quo grumi restitantes resolvant,
qua alias facile in corruptionem abe
unt, et ulcus producat, et phthisin
accelerat

13.) ⊕ Temp. inn. ord.

℞. ⊙ depur
♀ Olat aa ℥j. siv Arcan duplic.
Conch citr.
pulv. cort Cascarill aa ℥ß
~~℥ß~~ ℈j M. d. in x part.

Vere p polychrestis nam omnibus
viscosis fluidis ~~pbg~~ partibus opponi
t, et tonum relaxatum restaurat
absorbens citr. promovet diuresin
puh.

14.) ⊖ Antepilept: 1 ord.

Vor diesem bründen e basis ⊖lum bricor. ♁strium mense Junii in cordi collecti ppt̃io abluant vino 1. ♁ com: mucidital abstergendi, deinde modera to calore exsiccent ut φλογιστον evolet alias accelerat putredinem.

℞. pulv. Lumbr. ♁str. ℥ij.
Cordis exsiccati talpæ no. 4.
Tali lepor
ungul. alc. subtiliss: ppt aa ʒj Mopt
Div. in x part

15.) ⊖ Antepilept II. ord.

℞. Lumbr. ♁str. ℥ij.
succin alb. ppt
Glac. mar. subtiliss. ppt ʒij.
Rad. Paeon ppt
⊕ Bïl aa ʒß M. d in XII part.

Obs: Glac mar e specificum in affe- ctibg

ribus convulsivis et quibusdam placet pro lumbr. Ver. hinc conjuncta efficacio ra sit. Ol. animale ac Merc dulc non contemnenda. Praesertim circa phases lunae. contra Acredinem

Rp. Conch ppt ʒi
diaph ʒß. M. d. s.

2.) Pillulae.

pillulae purgantes usu non satisfaciunt

1.) Pil. Catarrhales.

Rp. Extract panchymag Croll. xij
~~de succin Crat.~~
Merc dulc ~~aa~~ gr viij
Resin jalap. gr. ij.
Ol. foenicul. gtt. ij.
M. f. l. a. pil. no. xx.
Laxant die sequenti adhuc, cum

cum alii alvum obserent obstruit, mensium quoq provocant. effectum edunt efficaciorem, leniore autem edunt sequentes.

2.) Pil. Laxantes.

℞. M. Balsamicar.
Extr. panchym. Croll. aa ʒß.
M. f. l. a. No. XX pro dosi. laxier pil. auf ein mahl zu nehmen in mittelmässigen [illegible] thun sie dz ipse mediocriter laxant; lenissime et sequ.

3.) Pil. Balsam. Viscerales

diese ist die allergelindeste species unter diesen 3. compositiones. pro: stant in formulare sub pil. No 13. ex hac conficiunt sequentes duae formulae, sive compositiones

Pil.

4.) Pil. Hoemorrhoidales.

℞. M. Balsamic ℈ß.
Extract Hellebor nigr. ▽s. ℈.
Cent. min vinos. aa gr v.
M. f. p. no. 20 pro dos., bey dn
2 – od 3. dos. kan m. glücklich
die hoemorrhoides provocieren

5.) Pil. Hydropica.

℞. M. Balsamic ℈ß.
p. vincetox et ♁ squill. aa g IV.
G. guttae gr ij – IV.
M. f. l. a. pil no. 20 pro dosi
ab initio tantum G. guttae ij pro
minant, seq. 3.–4 gr. Omnenis gr.
viij solum sine alii purgant

6.) Pil contra Obstructiones.

Manent ut in formulare extant p 83 No. 12.

7. Pil. Viscerales, resolventes.

Sunt qui scirrhis infarctibus etc. laborant, tales valetudinarii habent viscera compacta viscosa in mesenterio reliq partibus, ita ut materia gelatinosa cultro abradi potest.

℞ ♃ Mei + scilitico soluti ex inspissati ☿ dulc
Aloes gumos aa gr XV.
Extract. Hellebor nigr. ▽os gr. ij.
M. f. pil. l.a. no. 20.
propinentur allmonatlich über den Strumtag diebus vero intermediis resolventia sine laxantibus praeter ☿ dulc, qui facile salivationem perducere solet.

♃ Mc agit in partes mucidas lymphaticas
☿ dulc, in partes lymphatico serosas
Aloes cum Helleb, in partes grumosas sanguineas.

8.) Pil. Dysenterica.

Rc. ⊖ Cascarill. ℈ß.
Extract Cascarill.
Tormentill. aa gr. V.
M. de Cynogloss. gr. j. M. f. l. a. No.
XX pro dosi alle abend zu geben

9.) Pil. ad Gonorrhoeam.

Rc. Os Sep. ppt, ▽ catechu aa gr V.
G. Elemi
Masticis aa gr iij
Terebinth Venet q. s.
M. f. l. a. pil. XVj. pro dos.

10.) Pil. Anodynae l. Sedantes.

Manent uti in formulare sub titulo
Pil. Wildegansii genuina p. 34.
ubi motus non positive sedans, nam opii
laxantibus obvolutum, nullum infert dam
num

num quando p diem resolvirt und bey schlafen gehen mit gr. IV. gegeben thun herl. effect; also eg. mane pil confort gr XX et vespen gr. IV. vocat etiam Der Türkische Zug. ~ vid p. 218.

3.) Elect: Trochisc, et Morsul.

1.) Electuar. roborans.

Id. in febribg remotis removendis præcipue locum habens & satis secure, materia febrili expugnata.

℞. Roob Junip et conserv. absinth
Cort. Chin et Cascar. aa ℥ii.
aa ℥ß.
Extrac Cent Min:
Gentian rubr. aa ʒi.
Syrup. Cort Orant q. s. M. f. Elect. ad N. M. magnitudinem methodice adhibendi.

Methodus et fundamentū hujus consistit in eo, quod omnes febres intermittentes sine China supari possint inter

interdum vero circumstantiae exposcere
quasi videntur; occasio fuit bero data
ante XII annos, quo febres intermitten
tes grassati sunt. Tunc Candidatus ab
Hoffmanno in examine quaesitus, an
Tubingensis etiam Chinam in febribus
adhibuerint? Respondebat quod o. ille
postulabat, eum in finem variationis
gratia composita est haec formula ac
N. M. magnitudinem ante paroxys
mum exhibita non tam felicem effec
tum edit, quam si remotive à paroxysmo
scil. post paroxysmum singulis 2 vel 3
horis, alias motus audiores à natura
intenduntur, Die natur lost sich nicht
binden. Wenn man aber nach dem
paroxysmo sieht und solchen die
natur zu begütigen sucht, sie sich
eher auf, vel auf die bewegungen;
Wenn aber materia peccan nicht
völlig weg ist, so gehet es von
China nicht, das wegen hat man re
media

media causam febris pecantem zu removieren als Junip. &c. Cort Cascar ist auch sub adstringentis und balsamischer Efficacia, und solches gut zu machen weiß die ordentliche Ordnung möchten

Theriaca.

ubi omnia bona malis remixta sit Conf. post Ludovicum Stahlium, qui paucioribus speciebus Theriacam componere docuit omnes alias superantem, efficacia resolventis adstringentis.

Theriaca Concentrata.

℞. Rad. Angelica
Impator
Zedoar.
Gent. rub.
Pimp. alb. aa ℥ij.
Herb. Scordii
Card. bened.
Cent. Min. cum floribus
Ment: crisp. fumar. aa ℥j.

Croci

Croci or. ℥ß.
Ligni Aloes ℥j.
Pulverisata misceantur cum Spiritu vini 1.a extrahatur: deniq. abstrahatur sic remanet residuum in forma extracti, quod est haec theriaca.
Hujus usus est in acutis magis praeservandis quam ad curandum e.g. in febribus grassantibus, nun [illegible] hujus in [illegible] od brandtwein solviert und eingenommen ist in Cruditatibus ventriculi, vitiis primarum viarum, mucidis &c.

Theriaca Coelestis.

Rp. Theriaca concentr: ℥ß
Extract. Opii. Hyoscyam. Myrrh. ℈j
~~Ol. de Cynogloss. aa gr.~~ 3 ℈iij
Ol. Cardamom. ~~gtt. X~~ M. pro
Cinamom. aa
dos: Est anodynum loco pil. sedantium variationis gratia. vide p. 273.

Mors.

Morsuli Laxantes.

℞. Sem. Santon. ~~ſſat~~ ℨi.
☿ dulc.
Resin Jalap. aa ℨi.
~~ſſ~~ rosat. q.s. M. f. l. a.
Morsul. No 17. Infantibus gratissima
formula in vitio primarum viarum
aciditatibus; it: in verminosis affecti
bus adulto pro dosi dimidia pars mor
suli unius; infanti v. 4. pars

Morsuli Vitales Kunckelii.

Vide Dispens. Brand. p. 123. Morsuli re-
staurantes Kunckelii.

Methodus Kunckelii vid. p. 177.

Diese morsellen theilt er also ein,
daß auf ein jedes loth von einge-
machten citronen, zimmt und dergleichen
25. gr. von Antimonio kommen.
Von diesen ässet er des morgens
mittag und abends, eine; nemlich
einen auf 3. mahl, daß er also 25.
gr.

gr. vii des Tages nur beleben. Kurtz da von zu melden, er würde in einer Zeit von 4. Wochen ein recht gesunder Mensch, da vor er Gott nicht genugsam danken könte.
Wie auch dergleichen mehreren Exempl. videri potest in Dispens. Brand: p. 125.

Sequunt nunc Mixturae Concentratae, nempe Ess. R. Mixturae. et Elixiria

Has non in omnibus febribus adhibere possumus e.gr. in primis diebus febrium.

Essent. Laxans 1. ord.

℞. Rad. Jalapp. opt ℥viij
Pimpp. alb. ℥i.
ari. aa ℥i
Cort. Cinamom. acut. ℥ß.
Concis. contu. et cum ♈ digeratur filtret et c. ... edulcoretur pro dosi ʒij—vj. od. Löffel voll mit einem Anfang ...den, und so gradatim pro ratione aetatis.

Essent. Laxans III ord.

℞. Resin. Jalapp. ʒij.
Scamon. ℈i. solve in ℞ss.
ʒiv. adde ▽ Cinam. vinos. ʒß ~~ʒß~~. ad gratiam dos. ℈i — ʒß.

Essent. radicum

Dieses ist das fundament der Essent. Alexipharm. Stahlii, und von der Essent. catarrh. In febribus Acutis, per Acutis et malignis darf man dieses nicht geben, sondern nur in benignis.

℞. Ess. Angel.
Cal.
Dictamni alb. aliis Fraxinel.
Heleni, Imperator. aa ʒj.
Pimp. alb. et vincetox. aa ʒij.
olim Ess. contrajerv. at ~~pp~~ calorem et pretium omissa

Ess. Alexipharm. Stahlii.

℞. Ess. radic.
Scordii aa

Ped.

Sed quia Stahlius observavit interdum calida ee hinc temperatas selegi. et compos.

Ess. Alexiph. temp.

℞. Ess. Scordii ℥i
Pimp. alb.
Vincetox. aa ℥ß.

In acutis malignis et sensibilioribus Subjectis

Ess. Catarrhalis.

℞. Ess. Radic. ℥i
Succin. ℥ß. M.

bey hitzigen fiebern soll man die Ess. Temp. Alexiph. ordinaria, in hitzigen fiebern soll man die Temperata gebrauchen. diese folgende compositio kan man gebrauchen in allerley fiebern tam malignis quam benigni febr.

Ess. Temperatissima. Febrilis.

℞. Ess. Scordii
R. bellid. min.
Liquor terrae foliat. Tartari aa ℥iij

Ω ☉ dulc. ℥ij. virtutis diuret.
☉ dep. ℈i. M. f. Mixt. febrilis.
liquor ♁. foliat. tartari ist ein gutes
resolvens. der Ω ☉n wird hier zu gesetzt
ob virtutem diureticam.

Mixt. Emenagoga.

℞. ℞. ☉ii
Ess. Succin.
Myrrh. aa q. v. M. Crocus
jure omittitur pp ingratam, sabina vero
vehementior est. hier hätte man wohl
nöthig hat, die Myrrha und Succin.
bleiben basis von allen Mixt. Emenagog.
Wenn die motus sich gegen die partes
uteri sich befinden so kann man diese
Mixt. brauchen, wenn die motus aber
sich versus pectus befinden so soll
man dieselbigen nicht brauchen
Mixtio. Essentiarum ut non fiat [illegible]
fit sequenti in modum 1. ℞ ☉ii
misceatur cum Ess. Succin. hernach kann
man auch die andern Ess. und ℞.
vermischen sine [illegible]tione.

M. Pectoralis.

℞. R. Bii
 Ess. Amar. aa M.

Explicatio. etliche recomendieren dass die anis u. fenchel etliche tropfen hinzu thun, aber es können nicht alle Leuthe vertragen, und daher hat Juncker verordnet diese sollen heraus bleiben, diese z. R. et Ess. wenn sich etwas von ihnen zu sammen gemischt werden, so muss man nehmlich die Ess. Succini cum R. Bii mit einander vermischen so ist verlieret die andern Ess nicht von seiner würkung vid. Reichels Unterricht. Cap. III. ...

Der 1.) Methodus ex R. Bii ℨj. Ess. Succin ℨß et Ess. Alexiph. ℨj. die z ersten werden mit ein ander vermischt, hernach wird die 3te auch hinzu gethan.

Will u. jemand haben alia Method

2.) ℞. R. Bii. Ess. Succin et radicum aa ℨß.
seil Ess Alexiph.

[illegible] Asthmatica.

Vide Stahlii Diss. de Affectibus pectoris ibi mentionem facit etiam de cortice cascaril. quod mirabile praestet affectum in affectibus pectoris.

℞. Ess. Pimp. alb. et
Cascaril. saturat. aa p. e.

M. Nervin. Stahlii.

℞. R. [illegible] ℥j
[illegible] CC. rectificatiss. ℥ß. M.

Haec M. composita e. ex volatili et fixo, albo [illegible] Oxci,
CC. volatil.
fixum autem R. [illegible] [illegible] et vocatur mox M. tonico nervina Stahlii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

M. Hypocondriaca hyster.

et aliis generibus ex [illegible] sanguinis. Conducit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] M. pectoralis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vegetabilia [illegible]

[illegible]

aber pimp. alb. opium vero instar omnium vide p. 178.

Mr resolv. I ord.

Ꝝ. ℞ ♁ii
Ess. Succin. A
pimp. alb. aa q. v. M.
ibidem notandum quod ℞ ♁ii et Ess succin. prius imiscenda

Mr resolv. II. ord.

Ꝝ. ℞ ♃ri
Liquor. terrae foliat. ♃ri aa ʒß
Liquor anodyn. usitat. ʒij. M.
d. s. Mr zu 40 tropffen. in spissitudine sanguinis bey sanguinischen personen so durch u. glücklich bey nuchtern leuten propinari potest Mr resol. I. ord. propter spasmus opponitur hic liquor anodyn. zu stillen dass, wenn diese spasmi werden die vasa so sehr angustiert, und von der wegen wird dieser liquor hinzu gesetzt diese spasmi zu demulcieren.

Mr resolv. III. ord.

℞. Mr resolv. I ord. ℥j.
Ess. Lignor ℥ß
ol. Terebinth.
Bals. de Copaiv. aa gtt V. M.

diese Mr ist gut in affectibus ♀reis zu gebrauchen

Mr Antichol[ic]a.

Weil zu weilen grosse Schmertzen dasind und bey alten leuten Salina plenta nicht wohl anschlagen auch wieder durch Verabseumen, so dienet folgende

℞. Ess. Cort. citri
Orant. aa ℥ij.
ol. ☉ci anisat. ℈ij
ol. ♃ri rectif. ℈j M. d. s. dosis 30 gtt.

Mrae stomachicae, dantz 3. Compositiones in vitiis primarum viarum, in affectibus ventriculi mucidis, verminosis. wann der Kranke nur nicht selbst den Magen verdorben hat, so m. solche remedia stomachica gebrauchen. Also st. seq.

Ess. Anthelmintica.

℞ Ess. Zedoar
Gent rubr.
Aristol. rot. aa
℔ Tanacet
Absinth. aa ℥ij.
Cent min. haec Ess. vocantur specifica Amara anthelmintica praecipue aristoloch. O nulla praecedit dominatione.
edulc. ℞ q.s.

Ess. stomach. mord.

℞ Ess. Cort Citr.
Orant. A
Cinamom aa p aequ.
edulcorantur ℞ro q.s.
gleich viel jeweils sehr bitter also [illegible] dieser drusen [illegible] und [illegible] sehr [illegible]

Ess. stomach. a ord.

℞ Ess. Galang
Ari
card bened.
R Otis aperit. Ludovici aa ℥ij
card

card bened restaurat tonum ventriculi q
opt sic etiam R. ōis apt. Ludov.
Ess. Gent r. et Ari [illegible]

M. Nerv. I ord. Exter adhib.

℞. ♎ Serpill. abstract. ℥ij.
Lill. convall. abstr. ℥j.
ōō essati lign. Rhodi ʒ gtt xx
Mixtura Nervina duplicis generis pro ra
tione subjectorum ordinata, sc. quidam
amant grata ut haec M. quidam foti
da ut sequens.

M. Nervina II ord.

℞. ▽ Apoplect Langii. ℥j.
♎ CC. rectificat.
⊖ci rectific. aa ʒß.
Ess. Castor ʒj M.

M. balsamica in partibus laesionibus Sanguineis.

℞. Ess. Myrrh. ʒß.
Aloes ʒj
Succin. aa ʒij
ōō hyperici ʒj.

bals.

balsam de Copaiv. gtt vj. M.

M. balsamica in partibus ex sang: [illegible] glandulosis. ~

℞. Ess. Succin ʒß.
Myrrh. ʒij.
ol. Terebinth. gtt. XXX. M.

Haec comode unguentis digestiv. pro ratione partium laesarum immisceri potest.

M. odonthalgica Mynsicht.

℞. M. odonthalg. Mynsicht ʒij
Ess. Lign. Guajaci ʒj. M. gossypio exceptienda denti imittenda.

M. Topica vid. Lincker. form. [illegible] alius [illegible] Chymicus Dippelli vocitat

Dippellius interne quoque ea usus est propter quod Junckerus abstinuit ab usu interno sed tantum externe ubi hic ideo tantum vocat M. topica. et tot tantisque elogiis non praestat ad in doloribus arthriticis spasticis tumoribus inflamatoriis et interdum salutare

et

A citissimum praestitit affectum.

Ad in recentibus Vulneribus.

Praestat l'eau d'arquebousade modus praeparandi prostat in Jünkeri Chirurg. sic etiam balsam. Vulner. Dippelii ex herbis adstringentibus.
Hujus contusae Massae Spir. infundit. Spir. Vin. et ad dimidiam partem abstrahit.

Potiones, Julapia, Emulsiones, infusiones ac Decocta.

Notissimum est quod in febribus sub initio non possumus propinare Essentias.

Potio Diaphoretica.

℞. ▽ Scordii est instar omnium.
Card. Mariae
Galeg.
C.C. citr. aa ℥i.
Conch. citr. ʒß
Matris perl. ppt.
♁ diaphoret.
☉ depur. aa ℈ij.
... perl. ʒß. pro grato sapore

Potio Pectoralis.

℞. ▽ Veron. vinos. ℔j.
Syrup. de Erysimo Lobeli ℥ij M
Diesen potio soll m. for andern
recomendieret seyn lassen hierfat m.
nur resolvens und disentiens zu glaub

Potio Bruneri.

℞. G. Hei ℥ß sol in + li squil. ℥ij.
add. ▽ Veron. vinos. ℥iv. oe ☐ p o. gtt 30
ℋ opt ℥j. M. d. cochleatim
j–iij pro dos.
Man soll hier deinem patienten nie
unnen dass sie den häufligen ge
schmack sich nicht abschrecken lassen

Potio Analeptica à oro.

℞. ▽ Borag.
Buglos
Cinnamom sine vino
▽ Cidon

▽ Cidon
Rubi Ideci
flor. Ohonum aa ℥i.
Confect de Hiacinto incompleta da me: Alkermes aa ℥iß Clierte q compl.
Syrup. de Cinamom ℥i.
Ceras. nigr. ℥ß. M. d.

Sine fat m. nim potio analeptica vays vinuff.

Potio Analeptica M. ord.

℞. Succi citr. recent ℥ß.
Conch. pist ℥ß. post efervescent
add. Syrup. de cinamom. M. d. aus
Z. waß. ist nin angenehmes medica
ment und kan m. solchs gebrauchen
in hitzigen fiebern pleuritis febr. ca
tarrhali kan gebraucht werden.

Julap: Analepticum.

℞. ▽ Ceras. nigr.
Scordii.
Scorzoner.
plantag. aa ℥ij.

Syrup.

Syrup acetos. citr.
rubi idei aa ℥iß
Clis. Oii ♃rati qs. ad grat acidore
M.

Emulsio analeptica.

℞. ▽ de Crust pan. et
avena excorticata aa ℔j.
Amygdal dulc excort. ℥ij. f.l.a.
Emulsio add ▽ ceras. nigr. ℥ij
Cinamom ~~fine~~ vinos. ℥j M.

Species ad Infusa et Decocta.

Spec: Diaphor.

℞. Rad Scorz ner.
pimp. alb.
vincetox aa ~~M~~ ℥ß
ℌb. Scordii
Scabios. et
Galegæ aa M ß.
Incis. cont. M. pro infuso in sitzigen
fiebern bey solchen Kranken die
nicht mehr licht sind, und die trocken
sind

nicht Vertragen können.

Spec Cephalica vid Spec: Theeiform.

℞. Rad. Polipod
ligvir. aa ℥ß.
Hb. veron
betonic aa Mij. basilic. Thijm aa Mj:
Lig. Sasafr. ℥j.
Cinamom elect ℥j
Sem. anisi foenicul. aa ℥ij.
Concis. Cont. M. f. Spec. ad infus

Spec Pectoralis. Brust Thee.

℞. Rad Cariophyl
Ind. florent.
Brion
Ari aa ℥j.
Hb. Tussil.
Hyssop.
Cherefol.
Heder. Terr.
Veron Teucrifol. aa Mj.
Flor Bellidis
Scabios.

violar

Flor. violar. aa ℞ ij.
Incis: cont. M. dent. spec. ad infusa in [illegible]

Spec Resolventes.

℞. Rad. Gent. rubr.
Zedoar.
Galang.
Cyper. rotund. aa ℥i.
Hb. Serpil.
Philog.
hepat. nobil.
Capill. ver. aa Mj.
Flor. Galiops
Calend.
borag. aa ℞ ij.
Cort. Orant.
Crystal. ♀ri aa ℥ij. Incis. cont.
M. f. l. a Spec.

Spec Anthyphthis.

℞. Rad. Cicor.
Tarax. aa ℥i.
gram. et ℥i

liquir

Liquirit aa ℥ß.
ℋB. Veron. Tener. fol. Mij.
Sem. Carv ℥ß.
Cort Orant
Cinamon aa ℥ij. Conc. cont
M. d.

Spec: Emenagog.

℞. Rad. Ari
pimp. alb.
irid. florent
Rubiæ Tinctor.
Cariophyl. ~~aa ℥ß.~~ ℥i
ℋB. Meliss.
Artemis rubr.
pulez.
rons marin
Mamb. alb. aa Mß.
Flor. Chalend.
borag.
buglos. aa P ij. Incis. cont.
M. d.

Spec. Paracelsi correcta.

℞. Rad. pimp. alb.
Ari aa ℥i.
ℋB.

Hb. Veron
Heder. Terr.
Sanic.
pirola aa Mj.

Das sind seine spec. welche er gebraucht hat in seinem Hospital, und dabey hat er auch gesagt dass er können die laesiones interne damit heilen, die probe giebt er in äusseren Schäden, dass bey dem gebrauch der wunden sehr stark fliessen p. 5. 6. aut plures die hernach trocknen auf ein mahl und zu heilen. diese spec. habent vim sanandi et balsamica. ~

Spec: Mundificans 1 ord.

℞. Rasur Lign. Sassafr. ℥ij
Guaiac.
Rad chin. et
Sarsaperil. aa ℥i.
Cinamom.
Sem. foenic. aa ℥i.

incis

Incis. cont. infunde ▽ calida q.s. stent per noctem et mane coquantur ad remanentiam lb iij dos. ℥vj. warm getrunken und lässt dann Patienten darauf schwitzen

Bey der dritten grad[?] in lue grav[?].

Rad. Pimp. alb. und bardanae thun eben sehr gute dienste.

Spec: Mundif: m ord.

℞. Ras. Lign. Sasafr. pro piperib.[?] Pini.
Guaiac.
Junip. aa ℥iß
Rad. Pimp. alb.
bardanae aa ℥i.
liquir. ℥ß.
Hb. Saponar. Mij.
Sem. anis. ℥ij. M. d.

Saponar. ist ein besonderes Kraut und hat vim abstersiva in affectibus mucidis Rad. liquir. wird zu gesetzt ad gratiam willen aber in der nassen Compos.

Die

die cort. cinamon ersetzet die lieblich-
keit welche his speciebus interne cap. ut
antea.

Decocta Hord. et Avenacea.

Hord. c rasur. CC. ℥X gekocht als dan
von denen Cort. Citr. hinzugethan und
ein wenig von pastillis nitri condu-
cit in omnibus morbis acutis, uti videri
potest Richters Unterricht dieses
ist gewiss ein recht erquickendes
und angenehmes tranck.
Aliud Decoct. Aven. mit Cicor dieses
ist gewisslich so beruhmt dass man in
morbis cronicis sicherlich und mit
gutten Nutzen gebrauchen kan,
als in phthysin incipientem; dieses
soll ml. gebrauchen an statt des
Thee und Coffe, thut sehr gut
Hoffmann. hat in gebrauch
℞ Rad Scorz. ner
Sarsa paril. et

℞ Rasur. C.C. ℞
Ebori.
Daraus macht er Decocta und giebt den Patienten zu trinken

Spec ad Gargarism resolvens

Conducunt in morbis acutis wo ein böser hals zu besorgen oder schon da ist, in angina und in allen hitzigen fiebern

℞. Rad Fnd flor. ℥iij
Helen
Caryophyl.
altheæ aa ℥ß.
Hb. Salv.
bellid min l. hysop.
Fl. Cham aa Mß.
Caricar ping. no 4. coquant in ▽ simpl. q.s. add Roob diamor
alb grec aa ℥iij
⊖ crystallisat. ℥ß.
M. f. Spec l. a.

Spec ad Gargarism Adstringens

℞.

(No 3?)

Rx Rad. bistort.
Tormentil. aa ℥ß.
H. Brunel.
Pyrolae aa M.j.
Gallar. turc. ℥j concis. coq.
in ▽ com. colaturae addatur plus 1. minus
☉ crud.

In Apotheken verschreibt man e. gr.
Rx. Spec. ad gargarisma resolv. ℥j. und
ferner Rx. Spec. ad gargarism. ad-
stringens. Wann man denselben gekocht
so braucht man die selben warm
ein gespritzt in einem halben
Tag alle Stunden von dem gargar.
resolv. als dann giesst man resolv.
und adstringens unter einander
und braucht es ein vor in angina
bestehender, wann zum Ziel auf
schon ein 7. tag wenn zu ader ge-
lassen worden, dann dies ist ein
einfliessendes discutiens und abstergens
Cautel. die mischung muss folgender
geschehen nämlich von gargarism. resolv.
℥j

(No 9.)

Ist und von gargarism. adstring. usf.
M. 1. a.

Spec ad lotiones externas.

Man kan diese Spec. in allen ulcerationibus gebrauchen. nempe.

Rx. Rad Aristol. O.
 ari
 bardan. Major:
 Simp. alb. ℥j.
 Hb. Alchimil.
 Nicotian Mj. — dieses an stat der alchimil. in wunden etc. nur streuen kan.
 Hed. Terr.
 Agrimon.
 Prunel. aa Mj.

Ist der Schaden so beschafen das man kan den Decoct tabac gebrauchen so ist der besser als diese allen, als wie unfalb einzuspritzen da gehet es nicht an.
Concis. cont misce coquantur ▽ simpl. q. s.
colat: ℥vj. add mell rosar. ℥j. hin wund einzuspritzen soll man Hb. Nicot. aus lassen

Spec ad Clysteres.

Rx. Rad Althea ℥j.
 Hb.

℞ Malv.
veron.
Flor Cham. roman. et ℞.
Cherefolii aa Mjv
Sem. Aniß
foenic. aa ℥j.
lini ℥ß.
O depurat ℥j. Concis M.

brüh voll und schmaltz machen ein Clyst. Junkens schlagt ℞. veronica kommen zu thun in affectibus hystericis und hypocondriacis flatulentis mit baum öhl. nam e emoliens paregoriq.

Pro Clystere stimulante

℞. ℔j von anteced. ~~de~~ coct.
℥j von dieser z. Electuar. ~~extracten~~ eines
nehmender von Electuar dicolocinthod
von Hiere picre. kan m. darunter thun

Remedia topica. cu epidemica ex quibus tres potissimum sunt.

I. Emolientia.
II. Resolventia.
III. Discutientia, cu Nervina.

Varia dantur epidemata seu topica, quae autem applicantur vel Emplastra olea und balsama, his omnium fere loca expleri possunt.

Emolientia possumus applicare informa sicca et vaporosa l. etiam in forma cata plasmatis, quando coquuntur et denuo in spissentur

Resolventia possumus applic. informa sicca et humida coq. vel. vino, linctu ir rorando pro decoct. et applicando, per vaporosa siccus se habet cum sped. ner vinis. modo Emplast. in forma sicca, humi da, et vapida

Explicatio in Exempla morbosa egr. [illegible]

dass man gewiss seÿ und stillen kann
es seÿ m. von nöthen resolventia
hier zu kommen m. die spec in forma sicca
od in einem getranck in forma humida
aliud Exempl.

Es hatte jemand einen beülen an
einem orth, und die solte aufge-
hen so kan m. wohl ein solches
gemeldet in forma humida aber
nicht mit einem getranck sondern
mit ▽ od milch, und von diesen
mit lappen eingetunkt, od mit
einem schwam, und damit denselben
cum affectum gebehet.

Specl. Emolientes agunt non solum in
partes fluidas sed etiam in partes solidas
Resolventia potissimum in partes humi-
das coagulatas illas resolvendo et dissolven-
do
Discutientes potissimum agunt in tonum
relaxatum et sic part: roborant.

Spec: Emolientes. Exter.

℞. Rad. Altheae
Lilior. alb.
Liquir. aa ℥i.
Hb. Malv.
Melilot
branc ursin.
Ʒlis aa Mj.
Flor. Violar.
Chamom.
Papav. eratici aa ℔ij.
Sem. Foenu grec.
lini aa ℥ij. M. f. spec. l. a.

Spec: Resolventes.

℞. Rad brion:
Cariophyl.
Irid. florent.
Sigil. Salomon. aa ℥i.
Hb. Chamedrios
Hysop.
Marrub. alb.

Beton.

betonic. aa Mj.
Flor. borag.
buglos.
lavend. aa Mß.
Sem. Foeniculi et
Carvi aa ʒß M. f. spec. l. a.

Epithema siccum.

Dass ist dass gemeine haus mittel welches jedermann bekandt ist nemlich Rp. Saltz, kümmel, wachhol der beeren, und brot gemenget.

Spec: Nervini fulcientes.

diese bringet man ad Cucufas, kräutermützen genannt

Rp. Rad. Rhod. e specificum cephalicum
Calami aromatici
Cyper. O
Aristoloch. O aa ʒj.
Hb. Pulegii
Serpil.
Major.
Thimii.

Menth

Menth crisp. aa Mj:
Flor Anthos
Cheiri
rosar. rubr. aa Mß.
Gumi masticis
succini
benzoes Storacis Calamitae aa ℥j:
baccar. Junip. ℥ij:
Cariophyll. ℥j: M. f. l. a. spec.

Daß sind die 3. species welche eine unterschiedliche daraus machen können, denn es braucht eben nicht aller dieser Radices und Herbae zu ihr nen gesetzt zu seyn, wenn wir nur ein Paar haben so ist es genug. Die übrigen linimenta sind so bekannt od. beschaffen, daß sie lassen sich nicht in Apoth. preparieren.

Empl. Resolvens.

dieses Empl. kan m. in allen affectib. resolv. et Discutientib. gebrauchen. als Rp. Empl. Saponat. Barbett.

de

de Cicuta Foresti.

de ~~℞~~ Heo Foresti aa

Malaxentur cum ℥ camphor. dass Empl. kann man per spec verschreiben. hat man einen Zweck pro scopo resolvente so muss es largiter mit seyn, in offenen Schaden aber sine camph. damit es keine Schmerzen verursachet werden

Ungu. digest: I ord.

Conducit in læsionibus sanguineis vid. fun. Len formul: vide p. 221

ungu: digest II ord.

Convenit in læsionibus ex sang.

ungu Ophthalmicu

vide Tab. de ophthalmia.

ungu. ad scabiem.

vide Dispensat: Brandenburg:

quod

Quod balsama attinet soll in. sup. an allerweisten den geehrten Zu Vorschreibern den Bals. Schaichzer.

Collirium s. ▽ ophthalmica

℞. ▽ Euphras.
Flor Cian.
Calcatrip.
Chelidon maj.
rosar rubr. aa ℥ß.
Ol. alb.
℥ Vini aa ℥ß. M. filtret et guttatim ter p. d applicet oculo.

Morsuli Dlcs Kunckeli

℞. Amygd dulc. excort.
Pinear ⊙ rancid aa ℥ß.
Cinamom acut ℥i.
Cardamom decort ʒß
Dii stung ar. cnid ppl. not in ⊖ subtiliss. dirt ℥iiß.
ſſ cand. can. Rosar et Cinam au solut ℥iv M. f. l. a Morsul ℥i pond

M. Febrilis

℞. Ess. Scord
Ess. bellid. min
Liq. ▽ fol. ♁ni aa ℥ij
Sp. ⊖ dulc ℥ij.
⊖ depur. ℥i.
M. dos 40 gtt — 50.

Mixtura Emenagog.

℞. R. ⊙ii
Ess. Succin
Myrrh. aa ℥ij. M. D.

M. Resolv. Hypocondriaca.

℞. Ess pimp. alb.
Succin.
R. ⊙ii aa ℥ij. M. D.

℞. ▽ fl. Til.
Chamom. aa ℥iij
Elect Diascord Fracast ℈j.
Syr cort ☉ ℥iij
M. olla omnibus sumb ʒj. cochl. ij.
mane in cholera vomitus et sedes ex con-
suet contin.

#

℞. ▽ Scabios.
Card bend scordii aa ℥ij.
♁ diaph. ℈j.
Conch ppt ℈ij.
Succ citr. ℥ß M. olla 4 X 2 cochl
fol. roll in febr acut simpl.

#

℞. ☉ dep. ℥ij.
oc. 69 citr. ℥j.
Mater perl
♁ diaph
tre 2plic aa ℈ij. in 24 X 4
in febre. acut

#

℞. ℥ antisp. ℥j.
oc. 69 ppt.
☉ absint. aa ℈j.
Pulv. digest in Tertiana et quartana

℞.

℞. 🜄 Ol. ⊖ Absinth. Conch. ppt. aa ℈j
Dreyläuffen

℞. 🜄 Ol.
Conch. ppt. tdo cinn. 🜄 Sahrat. aa ʒj.
M. f. ⊖ abstergens in febribus hecticis

#

℞. ⊖ polychr. Pcl. ʒj.
Sacch. Lact.
Mater perl. aa ℈j
M. Dreyläuffern Pulver

#

℞. ⊖ Polychr. Pcl. ʒij.
Sacch. Lact. ʒj.
Coral. rubr. ℈j. it ⊖ Cascarill.
M. in Sudoribus nimiis hecticis

#

℞. Decoct. pan. dulc. et
passul. min. ℥vj.
infund. fol. senn. s. st. in ciʒ ʒiij
Agaric. Trochisc. ℈iv
Sem. anis. contus. ʒiß
Stent p noctē in vase bene claus. in

in loco calido mane post len ebullit exprim et Colat add Syr solutiv.
Diasec Andernac

℞ Jalap. ℈j.
Crist ♀ri ℈ß.
Magist Jalapp gr iv add
▽ Cinamom ℥ij.
ad 2 ✕ 4 Cochl. f. decoct Lax
in mehr. Acct

#

℞. Rad Cichor. Polyp.
Scorzon.
Sas. CC aa ℥ß.
Cogu. in ▽ simpl. M iv ad flav citr
Dulcor Syr ✝tos. citr. vel ... fiat potio
appropr. in febr. tertiana pro potu ordinario

#

℞. Rad chin.
Scorzon.
Cardan. aa ℥iij
H. veron M ij.
Trifol. fibr. M j.
Lig. Sassafr. ℥ß.
f. sp. pro Thee appropr. in febr. tert.

#

℞. Extr. P. Cr. ℈j.
Res. Jalap. gr. iij
M. lax in febr tert.

#

℞ Sp. diaral. Mynf. ℈j.
Res Jalap gr ij. M. dosys laxus

#

℞. ♃ Bl
☉ dep. aa ʒß.
⊖ Absinth vel Centaur
Rad Gent m. aa gr X
α oo ppt ℈j.
M. d in 4 pt. aequ. in febr. tertiana.

#

℞. ⊖ antispas ʒj.
Mater perl ℈j
M ad motus convulsionis refren in intermitt.

#

℞. Magnes alb.
Eptl nigr. Spec ceph
Arc duplic. aa ℈j.
M. dosys ubi simul convuls.

Laxans cum Epicrasi in febr tert suppress.

Rp. Rad Ari
Gent rubr.
Pimp alb.
vincetox aa ʒß.
Hb Cent min
Absinth.
Fumar aa Mß.
Fol Sen el ℥vj.
Fibr Ell nigr. ʒij.
Tart ʒß.
Incis contus f. spec cum ▽ ferv. ℔j ebull et remotis ab △e ad vin ℔ij. dos vitr. j.

Pil anticach

Rp. Extr. Panch C. ʒij.
Fumar
Cent min aa ℈ß
G. ✶ci
Galban aa ℈j
Myrrh ℈ß.
☿ dulc gr. XV. M f pil.

Rp. Ess. alexiph. ʒij
succin ℈j M. in Coryza.

℞. Ess pimp alb.
Succin.
Lig Sassafr. aa ʒj in Coriza

#

℞. Magnes alb.
Bez miner Wed
♃ ol aa ʒj. M. ad Coriza

#

℞. Ess alexiph ʒij.
Succin ʒß.
Rc ♃ri ʒj. M. in Coriza

#

℞. Rc propr Mijns.
♃ri ʒj. M mane

℞. Ess Lact.
♀ pect res. iv
Glycyrrh ppt aa ʒij.
M. post mend et vesp. in sputo Cruen
&c.

#

℞. Rc propr Mijns. ʒß.
♃ri ʒj.
Ess. Succin ʒß.
M flui mixtur in usu odi &c.

℞ Rad. Ʒ
 Anisi aa ʒiß
 Ess. Succin ʒß M. drygl.

℞ Ol. Anis.
 Sacchar Cand aa
 Aq. Ahum anisi q.s.
M. pect. simpl. Wed.

℞ Rad. Glycyrrh. ʒi
 ℞ flor ʒij
 Flor Anis. ʒß.
 Benz ʒj
 Sacchar Cand ʒij
 Aq. foenic gtt xx
M. pulv. pect. composit. Wed

℞. Rad. pimp. alb. ʒß.
 Rad. ppl
 Rad. florent.
 Sem. anis.
 Foenicul aa ʒij.
 Ol. Anis ʒi
 Sacchar Cand ʒiß.
M. pector. Menten.

(180?)

Incrassantia in Tussi

℞. Glycyrrh ppt ℥j.
Troch becch alb. cum Moscho ʒß
℥ Lactis ℥ij. M. bruss. [illegible]

℞. Glycyrrh ppt ℥j.
Rad Alth.
℞. Tussil. aa ℥ij.
Globul sacch mosch. ʒß. M.

℞. Conserv. ros. ʒj.
borrag.
Fl. prim ver. aa ʒß
G. prun. M. f Elect.
Nota G. prun et ceras. st. prestantio
ra q G. Arab. et Tragac.

℞. Extr. Glycyrrh ʒj.
M. de Cynogloss gr vj.
c Syr papav. rh. f. pil pond gr ij.
Conspergᵉ Liquirit. ✕ pro dosi repeti
ur. expectoratione nimia cave ne
phthysicis.

Lipothymia

Rp. ♎ lil convall.
∇ Reg Hung aa ℥ij.
♎ ⊖ ×ci ʒj. M applic naribg

#

Rp. ∇ Reg Hung. ℥ij
♎ ⊖ ×ci ʒj.
oo chim cinamom
caryoph. aa gtt vj.
M. applic naribg.

#

Rp. ∇ ceras nigr ℥iij
Meliss ʒj.
Tl Ont
Cinam c cordial
Syr. gemar aa ʒß. M.

#

Rp. ∇ ceras nigr.
Fl Til. aa ℥iij
Ont
℥ spec ceph. ʒj ∂j.
Sacch perl ʒß. M

#

℞. ▽ Borrag. Bugloss. ceras. nigr. aa ℥i
Cinam. Buglossat. ℥ß.
🜔 Matr. perl.
🜔 Spec. ceph. M. aa ℈i.
Julap. Gemmat. ℥ß M.

In Nachwehen.

℞. 🜔 polychr. Rell. ℈i
Bor. ven. ℈i.
M. 4 pt alle 2. Stund

℞. Ess. pimp. alb. ℥ij.
R. ♃n ℈i. M alternatim.

℞. 🝆 Chamom. lil. alb.
Cheir. aa ℥i.
Carmin. vulg. ℥ij.
M. inung. abdomen.

℞. ▽ Scorzon.
Card. bened. aa ℥iv
Meliss. ℥ij.
M. pro vehiculo pulveris.

#

℞ sp. diaiat M[illegible] gr vj. p. dosi

#

℞ R. Oii [illegible] ℥ij Mane et vesp. [illegible]

#

℞. fol Menth Mj.
fl Chamom.
Samb aa p ij.
Camph. ℈j.
f. spec p. sacc vino calid imbuend.
In hum testic infant ubi humor vi[illegible]
eid. vasa capillaria penetrare ne=
queunt herniam mentiunt, affect:
infant rustic. solennis vulgo [illegible]

#

℞. Rad. [illegible] flor ℈ß.
fol Veronic
Tussil
Heder terr. aa Mß
fl Scabios
Bass. rhoead
Prim ver aa p j
M. f. sp. p. infus in tussi siccasan=
guinea.

#

#

℞. Tamarind ℥ʃ.
Rhab el. ʒiv
⊖ ♃ni ʒj.
Coq in ʃq. ▽ colat add Mañ Cal
Br. ℥j. callide bibat pp dosi
In Tussi sicc. revin̄ gratia.

4o Tumores et inflammationes Mamarum.

α) Praeservativa

℞. Empl. de sperm. cet ℥ʃ.
bald post partu warm über ge-
legt und mamas ein gebunden
ne imat lac

℞. Empl. de sperm. Ranar ℥ß.
Sacch. ♄ ʒj.
Ol. Hyoscyam. q. s.
M. Streichen die schultern blätter auf
zu legen

℞. ☿ viv. streichen 2. Meß schalen
ap.

appende Collo inter scapulas.
Dieta sit tenuis aquosa et parum nu
triens

β.) Curative.

℞. Empl. de sperm. Cet. ʒß.
hie über weiche warme tüchl ge
legt, v.g.

℞. Fl. chamom. sambuc
Melilot Lavend aa p. ij.
Sem. Foenic Cumin
Anis aa ʒj. M. f. sp. pro sacc.

℞. Fl. Cham samb aa Mj.
Coq. in suffic. q. lact. Hujus decoct
℞. et imple vesica vitull deliga et
applica saepius ad mamas infl.

℞. Empl. Diachyl simpl.
de sperm. ceti aa ʒij.
M. applicet.

℞. Sem. cumin q. s.
affund ++ vin. f. decoct
linteis duplicatis öfters über geschla
gen
Zertheilung der milch über
glüssen

glühenden Kohlen aut sympathice
aut imaginarie operat.

℞. Ferment ℥ij.
Mell ℥ß.
Sap Venet ras.
Oo Cham aa ℥ij.

Cataplas maturans in Mam infl.

℞. Farin Seccal
Mell q.s.
Lactis et croco orient parum
in Cacabo warm gemacht und
mit Tüchern über gelegt

℞. Ol de succin Crat gr xv.
Extr. Elleb nigr. gr. vj.
☿ii dulc vel sublimat gr v.
M. f. pil pro dos. in ophthalmia

Angina.

℞. Rad Sig Salom.
Bistort aa ℥ß.
Hb prunell
Salv. Plantag

Plantag aa Mß.
℞ rosar ℥ß.
Granat ℥ij.
Alb Græc ʒj.
Roob Diamor ℥ij.
O. tabulat ℥ij.
O ʒj. conciß cont f Sp. p Garg off
▽ ℔iij coq q.s.
#
℞. ▽ Chærof
veronic
Card Mar
Hijsop aa ʒj.
Mandib Luc
ʒ diaph.
Dent Apr ppt aa ℈j.
Tabul man c ℥iij. M. f potio.
#
℞. ♀ civ ℔j.
△is cribr. ℥iij
ad ▽ ℔IX coq. p X ad
frigesc decant applic callid lint. duplic
express ... p ʒ in mam Scirrhos
locis carios genib fungos.
#

#

Rx. Res. Jal ʒj
Scam. ʒß solv. V. ℥xvj.
add ∇ Cinam ℥j.
Syr rosar solut ℥ij.
M. f. Ess Laxans.

#

Rx Ess Gent rubr. cent min.
Card bened Caminat Wedel aa
M f. Ess catarrhalis

#

Rx. Fl cham M.
Cyani seget
Aquilcg aa p ij.
℞ campk. ʒj.
M f. sperth ad oc inflamatione

#

Rx. R. Rhab. ʒj.
dos. 10 Tropfen mit dem gre
alternatim in tormin abdominis
infant

#

Rx. Magnes alb. ʒj.
Crem ♀ gr. x Cryst

Cryst mont ppt
℞ puriss aa gr v.
M. d in 4 ptl vor den Wiegen Kinder
in terminibg ventris

Diarrhoe a Infantum

℞. CC ust ℈j.
Rad Torm. on. aa ℈iß
∇ sigil alb. ℈j.
O dep ℈j. M f spec p Modulo
und gebrant dring 2 zumahl

℞. Corall rubr ppt
Crystal mont aa ℈ij.
∇ sigil alb ℈ß.
O gr ij.
M f dos. In diarrh pertinac cum tor
minibg in adultis allen 4 ℥ dosin.

In Crusta Lactea.

℞. R Rhab. ℨij ℥ri ℨß M. pro
bimulo m. et v. 15 gtt

Prolaps Vag. Ut.

℞. Sem Gramin. Sens. Mj.
Lupin Mß.
Sem Lin. ℥ß. in lacte coct f.

f. cataplasm ad emol. ut reponi possit prolaps.

℞. Vin. Rhen. ℔ß.

Croc. ℥j.

solvat. in vin. applica ope lint. calide

℞. ℔ Salv. min. ℳj.

D. S. äusserlich m. A. v. Zum Kräutern

Siccitas Vag. Ut.

℞. Rad. Gramin. Cichor.

Acetos. Asparag. aa ℥j.

℔ Serpill. c. fl.

Meliss. aa ℳj.

Fl. pap. rh.

Cheir. violar. aa p.ij.

Sem. anisi ʒij.

Rad. polypod. ʒvj.

M. f. l. a. spec. pro Thee

℞. Ol. Beech ʒß.

vitell. & tragan. ✕ vj. gr.

℞. Rad. Irid. flor. ℥ ʒß.

Ari

Sem. Sinapi aa ʒiiij. Ter

Tereb coct ℈j M. f c. s. q.
Mell pessus
adhibeb saepe folig ex emoll
℞. H. Malv
Alth.
violar
Branc urs.
Fl. Cham
Sambuc aa M.j M.
#
℞. ▽ prunell
salv. aa ℥ij.
Roob diam
Mell rosat aa ℥ß.
O ust ℈j.
M. ad absterg in aphthis
#
℞. vitell ov n. vj
Oo rosar ℥ij.
Croc
Boli aa ℈j.
M. brandsalven ad ambusta
#
℞. Butyri recens novies ligee fact
et in ▽ spec van Ata loh ℥vj.
Oo ovor ℥ij f liniment ad

ad Ambust. von Schiess Pulver

℞

Ag. rad Cyperi
Bistort aa ℥i.
Gall
Acaciæ aa ℥ß.
Nuc cupress.
Oss dactyl
Sem Myrtill aa ℥i
Picis et Colophon. q. s. f Empl
In procidentia Uteri

℞

Ag. R ♀ri ℨiij
Succin ℨi.
M. ter ℈ dem. 40 gtt prodosi

Ag. Extr. panch croll ℈ß.
Resin Scamon.
☿ dulc aa gr vj.
M. c Elix ppt. f. pil pro dosi in
Gonorrhoea virulenta

℞

Ag. R Scorzon. Glycyrrh. aa ℨiij
H veronic Mij
Beton
H prim ver

Cyan

Cyan aa ℳß.
M. f spec ℘ Thee in cale renū

℞. Vng diatth
Ol Scorp ℥ij
petr. ʒß
Vnum Valbor.

℞. ℳ de Succin Crat gr xv.
Resin Jalap gr v.
c Elixir Ppr. f pil pro dos
in aurin dolorib

Ad Furoos.

℞ Rad frid flor.
Aristoloch O aa ℥j.
Hb rosmar
Salv.
Ruta aa ℳj.
Myrrh et
Oliban aa ℥ß. Fiat. S auf zu legen
wann der Glied Wasser noch neu ist

℞ Ω formic
Ol Sambuc
V camph aa ℥j. M applic ℘ peni
cillum.

R.G.

℞. Empl. diapalm. ℥i.
Camph. ʒß. M.

℞. ∇ ♄ sat ℥i. ter aut quater de
die applic.

℞. oo ♄ri fœtid ℥ß ein ogstoren zu
gebrauchen
Conducunt Laxantia ad revellend lymph.
affluxum.

℞. Litharg. ℥vj.
Bol ar ℥i.
Mastich ℥i l. Myrrh aa ʒß.
∸ A vin. ℥xii
coq. p ☓ ¼ ein 4fach Tuch wenn
ein getraüft und frisch und aber in
bett applic.

Ad Sinoviam.

℞. Vin rhen. ∇ fl sambuc aa ℥vj
warm zu applic. præsente et urgente
plethora V Stio

℞. ♎ fl sambuc
Mastich.
∇ camph. aa ℥ij. M externe

℞. Ess Succin ℥ij
♄ Elemi Mastich Myrrha aa ℥i

℥ Therebinth. gtt. XXX

℞ Fl. cham
Sambuc
Salv.
Hb Menth
Serpill
puleg aa Mj. species pro
saccul. sicc

Defect Lact.

℞ Mater perl ʒj.
Lumbr ∇stri ppt
Lac. Da aa ℈j v dos
M. vesp et circ somn.

℞ Lac Da ʒj. Cryst ppt ʒß.
Lumbr ∇stri ppt ℈j.
Oo aniss foenicul aa gtt j.
M d in v dos

℞ Lac Da ʒj.
Cryst ppt ℈ij.
Lumbr. ∇str. ppt ℈j.
℈ diaph ʒß M.

℞. sem. Nigell ʒß. d pro dos in deffectu
lact a deffectu chijli

Sugillatio.

℞. Hb Arnic ver M i.
Fl Arnic M ß.
Incis f sp. p infuso Theiformi
quod propse extrahend

℞. Hb Scord
Millefol
Sanic aa M i.
M f c. ▽ decoct.
Colat ℥viij add
Ess. Myrrh ʒiß
Ɵ Aloes Socotr. ʒß.
Mell ros ℥ß.
Zum einschlagen

℞. Elixir pr Paracels. s + do
Ess Bals. Per aa ʒi.
▽ ♀ ʒiv
M Zum einschlagen

℞. Rad Scorzon. ʒß
Hb Veronic
Arnic ver.
Scabios aa M i.
Lig Sassafr. ʒij. M.

M. Heilender Thee

℞. ♁ campf.
▽ Anhalt āā
M. äusserl. den Rücken zu bestr. da der man beym rücken[illegible] ganz suggilliert

Tumor praeputii cum Gonorrh. virulenta.

℞. Extr. P. C. ʒß
Resin Jalapp. ☿ dulc āā gr. j.
M. pro dosi

℞. Rad Alth.
fol alb.
Rosmar. Salv.
Fl. Cham.
Melil. Sambuc āā Mß.
Sem Foenu Graec Lin āā ℥ß.
M. f. in milch gewärmt zu applic.

℞. Ung fusc. Wurz ℥ß.
☿ dulc ʒß. M.

℞. Empl diapalm ℥j.
camph ʒj
M. f. Pflaster in [illegible] den locum affect. zu accomodieren [illegible]

℞. R. ♃ni Succin aa ℈i.
Ol Terebinth ʒi.
M. mane et vesp. gtt XXIV.

℞. Rad Althea Lil alb. aa ℥ß
℞ Malv fl Melil aa Mjß
Sem Lin ʒi.
M. mit milch coq ad emoll

℞. Bals. Copaiv. ʒi.
einen kleinen Wund um sich fressenden flatt zu verbinden c Empl
diapal interne R. ♃ni bis 30 gtt

℞. ∇ fl Sambuc ℥viij
~~℥ Sal ppt ʒij.~~
℥ d. ʒß.
M. äusserlich um zu schlagen

NB.
Ante Salivationem proxime

℞. Rad Bard maj ℥iv
vincetox
Sarsepar
Lig Sanct
Sassafr aa ℥i. M. f Decoct

℞. ▽ fl. querc ℥iv
☿ Tit ppt ℥j
☿ dulc ʒß
vitr ♁i ℈j
M außerlich warm umzuschlagen

℞. ℞ ♁ii ℥ß
Ess pimp alb.
L. Sassafr. aa ʒij.
M. mane, vesperi gtt 30.

℞ Empl diapalm
de ran. cum ☿io vig aa ʒß.
M.

℞. Sem Lycop ʒiij
Tit ppt ʒij.
Sang. Drac ʒi.
M ♁ siccans

℞. Ess Alex
℞ ♁ ℥ aa ʒß
M.

℞. Rad Bard maj ʒiiij
Pimp alb
Sarsaparill
Chin.
L. Guaiac
Sassafr aa ʒi.
M. f. spec coq in ♁ 6 ℔ ▽ simpl
in ♁ vase bene claus 4. horis

℞

℞. Rad Sarsaparill ℥iij
Chin
Liquir aa ℥j
Cinamom. ʒß. f. spec
Coq in ℔viij ▽ simpl. wie das vorige zu kochen und pro potu ordinario zu gebrauchen ist kochen

℞. Rad Symphyti ʒß.
Frid fl.
Sigill Sal
Brijon
Hb. Hyssop.
Charefol aa Mj.
Fl. Sambuc Mß.
M. f. sp. p sacc. discut irrorch vino calido

℞. Hb Scord
Charefol
Bellid cum fl.
Sanic aa Mj.
Myrrh el. ʒij.
M. adf ▽ qs fiat decoct vulnerar
zum ein sprützen

Ky

℞. Liquam Myrrh. ℥ij
Bals. Copayv ℥j.
Thur Mastich ʒß aa ʒß.
M. f. Vng. mundific in Vulnerib.

#

℞. Sapon Ven ℥ij
bacc Junip. ℥j.
Camph. ℈j
Ol. frument simpl ℥iv
In Paralysi externe

#

℞. Lan ovill rec f. saccul applica abdomen infant in diffic mingendi

#

℞. Empl diapalm ℥j — ℥ß Erysipel
Camph ʒß ℥j — ℥ß Mam
M. f. Mass emplast dissipans Tumor et abscessus

#

℞. Empl Miracul ad Arthritid.

#

℞. Ceruss Min aa ℔j.
Ol olivar ℔iiß
Sapon Venet bene siccat ℥iij
Sapon minut secti liquef in ol adde

add vel f. l. a. Empl.
O vst ℥ß. ad ulc mal moris add
☿ in oleo solut ʒiß ad catarrh

℞. Empl Melil ℥i.
Diachyl c. gum.
Sperm. cet aa ℥ß.
Camph. ʒß.
M. mili dissip. Pflaster

℞. Empl melil ℥i.
Diachyl c. G. ℥ß.
Camph. ʒi.
M. ad tumor gland colli

℞. ☿ unguent lintea applicirt
warm ad mam, ad dissipand lac

℞. Empl Melil ℥i.
Diachyl c. G. ℥ß.
Camph. ʒi.
M ad emoll abscessus Mamar

℞.

Rx. ♄ crud. ⊖ Sal ℥ij alcali ℥ij
lass in tiegel schmeltzen, effunde
in conum, die scorias solviere in ▽
simpl. biss sie nicht extrahieret sind
filtra 🜔 cum [illegible] Oli et edulcora
In officinis schüttet man die j und
2 [illegible]onem weg, weilen sie schon
oppenieret und behalten nur die
ultima [illegible]onem quae e ☉ coloris;
sie aber behält m. alles zu sammen

Rx. hujus 🜔 ℥ij.
☿ dulc nicht [illegible] ℥ß.
Croc ♂tis aper Stahl ʒi ʒij
M. dos. 4 grana.

#

Rx Album ov ʒij
▽ ros ℥iijß
ôô ros ℥ß
Camph gr iij
M bene conquassando M ad vit
oculor

R.L.

℞. Alb. ov. N° ij.
▽ ros. ℥iij
Sol. armen. pulv. ʒij.
Camph. gr. vj.
M. ad ust. oculor.

▽ Phagedaenica

℞. ▽ ☿ viv. ℔j.
☿ subl. gr. XX solv. in hac ▽ und
Carpin-wasser auss zu legen in
Unreinen Wunden und Schaden

℞. ☿ viv. ℥j. solv. in ▽F ℥ij.
solut. affund ▽ C viv. ℔j f. ▽
Phaged. dass faule Fleisch weg zu
bringen

℞. Oo amygd. dulc. ℥iij
℞ canar. ℥j.
M. f. liniment. in ust. Lingua

℞. Mell. ros. ℥ß.
Oo Myrrh. p. del. ℥j. M. in ust. Ling.

Liniment [illegible] [illegible] [illegible]
num [illegible] humores
et induration [illegible] [illegible]

℞ Sev bovin
Mell despumat aa
quodlibet honum liquefeat seorsum tan
dem misce, applicat sup linteo, exten
sum

Cataplas[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

℞ Hb Euphras
Veronic
Hijsop
Fl Salv. aa Mj.
Cham Salv Sambuc aa pj
Sem Foenic ʒiij
spec pro sacc vinos in contus oculi

℞ Amijgd dulc excort ʒiij
amar ʒi
terra in vase apto et affund Lact bul
lient Mij add Carijophill ar
Cinamom a aa ʒß
vitell ov no ij [illegible] lacte
frig

frig seors mit ebulliant de novo omnia
add Sacch. q.p. ut Chocolade

‡

℞. Amygd dulc decort
amar aa ℥ß.
Contund affund Lac bull ℔ß
add parum cinam – et caryophil
Sacch. q.p. fiat Chocolada.
Malum [illegible] mit Zittern der Füßen.

℞. ℞ [illegible] ℥ij
Ess. Succin ʒi.
M!

‡

℞. ○ antispast ℥ij f 6 dos alternat

‡

℞. Extr ß. Croll
Spec diaiat M aa ʒß.
M. c Elixir ppt pil pro dosi

‡

℞. ℞ Verbasc Mj.
Sap ven. ℥ß.
Infund c ♁ äusserlich dass bein zu netzen
pro robustis.

#

℞ ℔ Agrimon.
 Virg. ⊙
 Fl. Cham.
 Summit origan.
  Millefol. aa M. M. f.
spec. p. sacculo mit vino calido über den Unterband zu legen in vulneribus puncturae.

#

℞ ∇ Scabios.
 agrimon. aa ℥i.
 Mell rosar ℥ß. M. zum einstreichen in diese Materia fliessend zu machen

#

℞ ∇ Scord. Millefol. aa ℥ij.
 Extr. Scord ℥i.
 Aloe
 & Myrrh el. aa ℥ß.
M. zum einstreichen bey arbeyt stinkender Materie.

#

℞ ∆ Fl. Cham.
 Lil. alb.
 Lin. aa ℥i. M. f. Clyst. in pestinae alv. obstruct. infant.

Can

Gangraena et Sphacelus.

℞. ▽ Fl. Sambuc ℔j.
Plantag.
fol. querc
Scord aa ℔ß.
Lixiv ♁ viv. ℔ij.
♀ comb.
Litharg. aa ℥ij.
Oliban
Myrrh aa ℥ß.
Camph. ℥ij
in olla nova vitreata coq. X ß. subinde
umgerührt, sed operculo tecta. sit olla
applicetur calide alle 2 X mit doppelten
Tüchern umgeschlagen C. sphacel

#

℞. Ess. alex. mane
℞. ♃ febr. ut ord post meridie

℞. ▽ Scorz
fl. acac.
Sambuc aa ℥iv
Syr. acetos citr.
pap rh. aa ℥ij
Potio saepius.

#

℞. Ol. gris Lateranus Clav. 2–3. 6
post XII X. appl. Emplr. seq.

℞. Gum Galban
Aceti aa ʒß. solv. in suf. q.
et inspissa. add Euphorb ʒß.
Ol. ust. gr. 45.
vit. ar. dijß
℞ dulc. vulg ʒj:
oo Euphorb
Cer. q.s. f. l.a. Empl.

Ad Clavos Pedum.

℞. Rad Poeon rec. scind. in tal.
[illegible]
[illegible]

℞ Ung. dialth. ʒß.
oo pett alb. ʒj.
Camph. ℈j.
M. in extensione tendinu [illegible]
[illegible]

℞. Empl. Diapalm. ʒß.
Camph ʒß. M. ad loc. affect.

℞. ☿ii ℔j.
▽ pluv. ℥xiii
ebullit. add Ol ♃ nati ℔ß.
Stent X xxiv in digest.
add Gall. ℔j ℥iv
G. ar. ℥ij M. f. l. a. atramentu
egregium.

Arcanum DD Junkeri
in Hydrope

℞. M. Conf: ℥ß
♀ Rad. Vincetox. ℥ij.
Squill. ℥j.
M. f. Pil. G. Gutt gr. iij. pro re nata. scil. ubi aestus
adest ibi non possumus propinare, sed
ubi aestus non adest, ibi illa qua specif.
cum et bono cum successu propinare
possumus.

granu σιταριον ℈ß. — — gr

Siliqua κεράτιον gr iv ʒj = gr. xx

Obulus gr x — — ℈ij. — gr xxx

Scrupulus Δυοβολον ℈j — ʒß. — gr. 30

Sicilicus ʒij. — — ʒj. — gr 60 = ℈iij

Sextula — ʒß. — — ʒij — gr 120 ℈iv

Duella ʒvj.

vncia ℥j. ʒiij — gr 180 ℈viij

Sescuncia Sescunx ℥ß ℥ß. — gr 240 = ℈xii

Sextans ℥ij. — — ʒv. — gr 300 = ℈xv.

quadrans ℥iij — ʒvj — gr 360 ℈xviij

Triens ℥iv — ʒvij = gr 420 = ℈xxi.

Quincunx ℥v. — ℥j = gr 480 ℈xxiv.

Semis Semis ℥vj. ℔j. offic = ℥xii

Bes ℔ß.

Septunx ℥vij. — ℔j civ. = ℥xvj.

Dodrans ℥ix.

Dextans ℥x.

Deunx ℥xi.

As ℥xii.

℞. Opii end Colect
Extr. Fibr. Helleb nigr. aa ʒß.
Myrrh solut ℈iv
Theriacale ʒi.
Croci orient ℥ssat ʒij.
Oo Junip. ʒß. M.d f.l art. Pil.
vide p. 140.

Mℛ Resolvens in morbis
♀reis

℞. Mℛ resolv.
Ess Lignor aa ʒß.
♄ Terebinth.
bals. de Copaiv aa gtt v. M.D.

Mℛ Anti colica.

℞. Ess cort citr.
♁nim aa ʒij.
Ꭾ ⊖is ℋci anis. ʒij.
♀i recht ʒj.
M. d dos gtt 30.

Mℛ resolv antispastica

℞. ℞ ⊖is ♀ri
Liq ▽ fol ♀ri aa ʒß.
Anodyn ʒij. M.D.

Mr Topica s. sapo Chymicus.

℞. ⊖ ♀ ℔j.
♄ crud ℔ß.
gis 1/4 ℔

funde ad scorias (NB. non debet fieri regulus) Scorias nondum refrigeratas tandem, et imbibe ol. Juniperi 1. terebinth. q. s. ad consistentiam pulpamenti

Infusa Decocta Laxans 1 ord.

℞. Rad. Ari cichor.
pimp. alb. aa ℥ß.
℞ Chamaed
Chamepitl. Dulcq.
Serpill aa Mß.
Sem foenic. Cari aa ℥ij.
fol. Sennae el ℥ß.
Fibr. Helleb nigr.
Anjon ata ℥iij
Cort Onim ℥ß.
♀ri Olat ℥vj.
fne inf libr IV. ♁ et quando refr. 4℔ vini

Species Laxans II ord.

℞ Rad Aristol rot
Gent rubr.
vincetox
Scorzon. aa ℥ß.
Hb Adianth alb.
Agrimon.
Origan
Anagall. pun. aa Mß.
Agaric l. Mund
Rad Bryon aa ℥iij
Flor Acac Mj
Persic Mß.
Cort citr. ℥iij
Tri solub ℥ß.
Inc conc l. a. d. hinf: vin

Spec Lax III ord

℞ Hb. et Fl. Amaranth: purp.
Acac aa Mij
Bellid rubr. Mij
Passular cor ℥ij.
Lig Sanct. ℥ßj
Fol Sennæ ℥iß
Cort citr ℥j
Cr. Tri aa ℥ß. C. adfund Hiij — [illegible]

Decoct in Cranibg morbis acutis

℞. Hord mund Mj.
C.C. rasp. Mj.
frische Zitronen schalen ʒß.
pass min Mj.

Spec ad lasiones extern.

℞. Rad Aristol rot
Ari
Bardan Maj
Pimp. alb. aa ʒj.
Hb. Alchimil
Heder ∇str.
Nicot. aa Mj.
Agrimon
Pimpinel aa Mj. C M D.

Vngu Digestivum 1 ord in las. exsang.

℞. Terebinth ʒj.
Mastich
Oliban
Myrrh aa ℈j.
ꝯ croci ℈ß.
vitel ovor no j. M D.

Vngu Digest ii ord in lasionibg sanguinis

℞ Mell ʒij
Terebinth ʒß. Myrrh rubr. ʒij
vitel ovor No ij M. f Unguentum.

Berliner blau auf eine andere weise zu machen

℞. Sanguinis bovini bene siccati et pulverisati ℔ʃ. ♀ crud. ⊖ crud. aa ℔j.

♀ et ⊖ M. et in tigillo seorsim carbone ardente accende et sic detona, dein pulverisa et misce cum sanguine pulverisato, quæ calcinentur una in tigillo usque dum fluere incipiat quadantenus in forti △ ad 2. X fere, hinc affunde in laminam ferream Massam quæ conum representat ut paululum refrigescat, hinc imitte conum integrum non pulverisat in ▽æ ferventis M vj. et solvatur quasi hoc lixivium ... et filtretur per cartam bibulam, quod ad ulteriores usus ad △ ponas

porro prepara lixivium sequentem

℞. ⊖ crud ℔ij. solv. in ▽ ferventis M.x. ⊖l Anglic. s. ♂ ℔$\frac{1}{4}$. solv. in ▽ ferv. Mij. hæc duo lixivia separatim facta combinentur et ad △ rursus incalescant

lescant et ebuliant uti et lixivii Sini
f. sanguineum, usq dum misceant. Tum
sh. duas ollas quarum qualibet 6. aut
8. mensuras ad minimum contineant, ac
inde in una lixivii S.ino My. in altera
lixiv. + di My. haec lixivia invicem
misce et quidem primum lixivium Si
num in lixiv. + dum infundere debes
sup vas satis capax, ▽ calida semi re
pletum ac filtro linteo sup tenaculo
expanso, instrictum et hanc effusione
ac infusionem tam diu continua usq
effervescere desinant, quod ad 200 re
petitiones fere fieri debet. his bene inter
se combinatis, effundantur una cum his
lixiviis jam una olla contentis, ▽ae frigi
dae My in filtrum et quidem sensim
sensimq quo citiq refrigescat, & hanc
mixtionem lixiviorum ac effusionem
cum ▽ frigida tam diu repete usq dum
omnia consumta, sic color coeruleus in
filtro remanet, quem ▽ frigida ab adhae
rescenti

rescenti ⊖ce edulcora, quem porro leni
calori aut in aere umbratili exsicca
et quidem in patina ampla.
Portiuncula quaedam p. filtrum transit,
quam v. substrata vase subsidentem de
cantata ▽ colligere potes, quae non tam
album colorem praesefert, hujus coloris
olim th. consistit 24 th. jam vero
4 th. omne punctum fit in mixtione,
nam quo saepius funditq, eo coeruleus
color exaltatq, hicce color cum ana t pot:
Auripigm. junctq gratam viridescit, et δ
adeo decoloratq, uti hic dejudico alii exal
tant illum antequam poenitq siccescat
cum ♌ + do quodam sc ⊖ l. ⊖l. q.

Methodus
In propinandis antecedentibus Compositis.

vide p. 57. usque p. 124.

1. Pulveres.

℞ Purgans I ord.	In robustioribus.
II ord.	In Atrophia Infantum.
III ord.	In Vermibus Affect.
℞ Sedativus.	In Diarrhoeis sudoribus in nimiis doloribus vesp. dos. ℈.
℞ Temp. I ord.	Temperat leniter demulcet spasmos et orgasmum in calculo Ischuria Stranguria dysuria, Ischias Diabete in casu ē vg. ꝯ Antispast. diureticus ad flatus, ventriculi haemo. pt. phthysin, nictum emenhum &c.
II ord.	In haemorrhagiis narium haemopt. aut aliis nimiis affectibus biliosis omnibus excretionibus nimiis Ischuria binis horis dos. ℈.
III ord.	Leniter sedat discutit in affectibus haemor

	hoemorrh. & ubi adest sanguis con= grumatus et dolores it: in doloribus capitis l. a vita sedentaria l. &c.
♁ Febr. I ord.	In febribus acutis ut & in calore febrili ubi adest materia agilis et subtilis. ~
II ord.	In affectibus biliosis diarrhoea sym ptomatica in febribus acutis ab initio ad praeparandam materiam et secernendam, postea ubi sudor adest et ubi vomitus it ubi jam effervescentia cutanea
III ord.	Bezoardicus e pro digestione leni in febribus intermittentibus ubi semel materia viscida mucosa in primis viis 2.) Diureticus, in affectibus quibus à vulgo dicunt Wehetun orgasmo in terrore bile. &c.
♁ ad Congestiones	Praemissis praemittendis in omnibus congestoriis ad pectus in affectibus spasticis, in omnibus affectibus chro nicis pertinacibus, prima dosi vomi tum excitat. ~
♁ Resolventes	In vitiis crasso lymphaticis laudem mere

	meretur. vel in scabie pertinaci Chronica. ~

℞℞ Pilulæ. ~

Pil: catarrhales.	Conducunt in vitiis Lympha ubi viscositas mucosa in primis viis haret in affectu catarrhali sine febre in oppletione pectoris, in affectibus oculorum, in scabie. &c.
Purgantes.	Pro scopo præservationis in affectibus serosis, pro robustioribus malo fschia deco. &c.
Hydropica	In affectibus oedematosis hydrope et humore pedum. &c.
Resolventes.	In affectibus pectoralibus Infsi fsta tibus v.gr. Lienis hepatis. ~
Contra Obstruct alvi:	Mon Ron mane quotidie donec relaxet alvus 4 pro dosi. 8 Inn. unu vesperi simul sumtis & diges dos 1.
Confort: uterini.	In affectibus mulierum omnibus vitiis fluxus menstrui, in tumoribus hæmorrhoidibus coecis hæmopthysi,

mictu

michi cmento noxia no— —(.
in calculo effectum sæpius edun
optatum citta Crassam evacua
tionem scil motg alterando .~

III Essentia

Ess. Asthmatica — Agit in tonum in asthmaticis af
flectibq ~~pro scopo diapnoico re~~
~~solutario in~~ spasticis lenit leni
discutit resolbit in tussi symptoma
tica et stomachali .~

Ess. Catarrhalis — In omnibq affectibq catarrhali
bq pro scopo diapnoico resoluto
rio in declinatione febrium Sto
machealium in scabie in affect
bq arthriticis

Alexiphar: — Est, in febribq catarrhalibq beni
gnis pro scopo diapnoico in di
arrhoeis febribq intermittentibq
Diaphoretica in humoribq ubi
in genere æqualis distributio
sanguinis et humorum necessa
ria

	na in tussi catarrhali.
Alexiph: Teriac	Ubi aestus insignis in febribus mali gnis ut et benignis ubi subjecta sen sibiliora sunt praeservata putredi ne ob scordium intermixtum.
Stomachica. l. Amarae.	In ulceribus scorbuto scabie me grea, phlegmacca chachexia in mucositate primarum viarum ad confort: stomachum fluore albo, colica flatulentia diar: rhoea biliosa, disenteria, agit in materiam incidendo et resolvendo.
Ess. Carminati va.	In flatulentia.
Ess. ♂tis.	Agit in tonum materiam visco sam stomachalem
R ♂tis	In laxitate ventriculi

IV Mixturae.

M. Resolvens	In affectibus hydropicis et pecto ralibus humidis in congestione catar:

	catarrhali ut et scorbuto Iue grea cum usu pilularum catarrhalium. ~
Mr. Pectoralis	In mucositate viscida primarum viarum pro scopo resolvente in pectore. Item in Diarrhoea Colica Arthritide e optimum remedium. ~
Catarrhalis	In congestionibus ad caput affectibus otalgicis tinitu aurium et sic porro. ~

Modus ægros examinandi in casibus necessariis.

1. Ætas et sexus præmittantur
2. Vitæ genus cum temperamento et animi pathematibus explorentur
3. Evacuationes sanguinis naturales et speciatim in sexu sequiore puerperia cum lochiis ultima examinentur.
4. Evacuationes artificiales tam sanguineæ quam serosæ muciosæ
5. Morbi prægressi tam ægrorum quam parentum perquirantur et illustrentur.
6. Morbus præsens, quam æger sub initium diffuse et confuse enarrat in justum ordinem redigatur.
7. Et si inconsueta symptomata conspirent in curationes sinistras inquiratur. —

Dispositio Casuum Conscribendorum.~

I. Affectus qualis.~

II. Causa vel materiales, l. occasionales l. formales. CCC.

III. Prognosis.~

IV. Methodus Medendi.~

V. Cautelæ.~

Potion: Analeptic:

℞. Aqua Ceras. nigr.
Scord.
Scorzon.
plantag — aa ℥ii
Sirup. Acetos. Citr.
Rubi Idaei — aa ℥iß.
Clÿss ♁ij. q. s.
ad grat. acor.
Misc.

Aqu. Ophthalmic.

℞ ▽ Rosarum.
Cyani.
Euphrasiae.
Chelidon. Maj.
Calcatripp: aa ℔i.
Ol. alb. — ″ — ℥iv.
Misc.

Stellen in die Wasserschaft auch niemahls, sind in formulare funken. ~ pag. 32

℞ Extract Cathol. ℈ß.
Ellebor: Nigri gr: v
☿ij dulc. gr iv
Gumm. Gutt.
resin Jalapp. ana gr. iii
M: f: pil: N.° XX

Spec. Emmenagog.

℞ Rad. Ari Caryophillat.
Rub. Tinct.
pimp. alb. aa ℔ß
Hb. Meliss. Pulegij
Marrub. alb. chamedr
Rorismar. Artemisiæ
— — aa M: viij.
Flor. Calendul. M: xv.
Borragin. buglos. aa M: v
Cort: Citr. ℔ß.
Incis & contus M: f. species, Gross
modo.

Spec. Correct. ad Decoct. Parac. ~ II ord.

℞. Rad. Ari
Vincetox.
pimp. alb. aa ℥IV.
Hb. Veronicæ
Centaur. Min.
pÿrolæ
Saniculæ
Heder ▽stris aa M: IV.

Incis. et contus. M. f. Species, Grass, modo Species Paracelsi correctæ II ord.

Species Paracelsi correct. III ord.

℞. Herb. Veron.
Cent. minor.
Pÿrol.
Sanicul Heder ▽str. aa q.p.

Incis. M. f. spec gross. modo.

Species Emenagoga.

℞. Radix Ari Caryophillat pimp alb. rub. tinctor aa ℥ß.
Herb Meliss. puleg. marrub. alb. Rosmar Artemisia a Mviij
Flor Calendul Miv.
Borragin Bugloss. aa Mij.
Cort. Citri. ℥ß.
Incis. cont. M. f. spec. gross. mod.

Species Mundific. 1. ord. ~

℞ Ras. Lign. Sassafr. ℥iv.
Guaiac.
Rad. Chinæ
Sassapar. aa ℥ij.
Cinamom.
Sem. Foeniculi aa ʒij.

Misce f: species. ~

Spec. Mundific. M: ord. —

℞. Lign. — Pini.
Juniperi. aa ℥iv.
Rad: — Pimp. alb.
Bardan. aa ℥ij.
Herb. — Saponar. Mij.
Sem. — Anis — ℥ß.
M: f Species Gross. modo. —

Spec. p Gargarism. Resolvent.

R. Rad. Irid. fl: ℥iij
Caryophillat.
Althea – aa ℥iv.
Herb. Salv. Bellid. min.
Hyssopi.
Flor. Chamom. vulg. aa M: iv.
Paric. pingu. ℔ß.
Misce f: spec. gross. modo.
huj. itt Decoct. R Specier. ℥iv coque
A add. O depur. ℥ß Roob Diamorum
℥ß. Misce pro garg. –

Spec. pro Gargarism. adstring.

℞. Rad. Torment.
bistortæ aa ℥iv.
Herb. Sanicul. M: viij
Gallar. Turcic. ℥i.
Misce fiat species gross modo. huius 1 lb Decoct.
℞ Species. ℥iß coqß et add.
Alumen crud. ʒß.
M: f: gargar. –

Species pro Clysteres:—

℞ Rad. Altheæ ℥i
Herb. Malvæ
Veronicæ
Cherefolium
Flor. Chamomill. vulg. aa M: IV
Sem. Anis. foenicul. a ℥i
Lini ℥ß.
⊕ Depurat. ℥i

M: f: Spec. [illegible] Decoct ℞ species ℥ii
Succ. [illegible] III ord.

℞. Rad Aristol. rot. Gent. rubr. Vincetox. et Scorzon. aa ℥ß.
Hb. Adianti albi, agrimon origani et Anagallidis puniceæ aa Mß.
Fung. Agarici
rad bnion aa ℥iij.
Flor. Acatiæ Mj
persicor. i Mß.
Cort. Citri. ℥iij
🜄 solubilis.
fncis contus. l. art infus. cum vino [illegible]
[illegible] laxantium [illegible]
[illegible]
[illegible]

Species ad Infus. Lax.
D: Prof. Junk:

℞ Rad. Ari. ℥ii
pimp. alb.
Vincetox.
Irid. flor. aa ℥iij
Herb. Cusc. Epithim.
Sumit. Cent. min.
Marrub. alb. aa M ß.
Fol. Sennæ s. st. ℥vi
Fibr. helleb. nigr. ℥iij
Rad. brioniæ polypodii aa ℥ii
Cort. Citri Aurantior.
Cr. Tart. aa ℥ii
Incis. contus. M: f: species.

alia Formul. Spec. Lax. 1 ord. D. Junk

℞ Rad Ari
Cicor
Irid. flor et pimp. alb. hæ sunt rad resolv.
aa ℥ ß.
H. Chamædrios
Chamepithdis, hæ sunt quod agunt in materiam
pulegii et etiam in motum.
Serpil. aa M ß.
Sem. Foenic.
carvi aa ℥ii
Fol. Sennæ sine Sti pitibus ℥ß.
Fibrar. Hell. nigr.
Rad. brioniæ aa ℥iij hæ sunt laxantia.
Digestiva. Cort. Orant. ℥ß. Tart. Ol. ℥vi. incis. adfundatur
Aven... thj. et quando respicit vini... ℥vj. ... ultra
... p. 248. *

Pulv. Digestiv. 1 ord.

℞. ♀tri Olati 1 ℔
Conch. ppt. ℔ß.
M: f: pulv.

pulv. pro suffitu

℞. G. Storac Calamit
Mastich.
Succin aa ℥i.
Sem. Foenic
anis.
Carv. aa ℥ß. Con. gross. mod.
M. f. pulv. l. a.

Pulv. Resolvens.

℞. Conch. pp. ℥iii
☿ dulc. subt. trit. ℥i.
Misce bene.

pulv. Emeticus.

℞. ♀ Emet ℥i
Ol ℥iij M. f. pulv. dos. gr. xii.

Pulv. contra Hæredin.
D: Junk.

℞ Conch pp ℔.
🜍 ℥ij diaphor ℥ß
M: f pulv subtil:

🜍 Dentifricius.

℞. Lap. pumice ℥vj.
Oliff.
🜄 alb. ʒiv.
rad irid flor ℥ij:
℞ Mastic ligni Rhod gtt XX.
Caryophyll. gtt XXXii
Lac conglob ʒiß M.

Vngu. Mercurial...

℞ ☿ ℥ii et ♄ni ʒij.
🜃 Tripol ʒi:
Vnguent. Rosat ℥v.
M: f: Vngu.

Vngv. Ophthalmic. nov.

℞. Mel opt. ℥ß.
Θ alb. gr. xv.
Misce.

🜍 Purgans 1 ord.

℞ Jalapp resinos ʒß.
🜄 Olei ℈ij.
🜍 anis gtt XII M. dos. gr. XXIV.

Vngu. Ophthalmic DD: Junk.

℞ Butyr majal s. Θ. c.
Tutia pp ℥i.
Corall rubr. pp
Camphor. ~~℈i~~ ʒni aa ʒß.
Nihil. alb. ʒij
Virid aris gr xij
Misce opt. f. Vngu. ~

Pulv. Pectoral: DD. Junk.

℞ Sem. Lycopod ℥ii
rad. Iri ppt.
Oii diaphor aa ℥i.
Oii gr. XV.
M: d: in 9. p.

alia ♁ Pectoral.

℞. Sem Lycopod
♁ diaphor
rad. iri ppt aa ℈i.
Oii gr XV.
♃ cand q. s. ad gratiam M. dos. ℈ij.

M. Tonic. Nerv. Stahl.

℞ Tinct: Oij ♃r.
♁. CC. rect. aa ℥ii.
Misce.

Pulv. ad Congest. –

℞. [symbol]r. ☉ ʒij ultim=v=tion.
[symbol]r [symbol]at. aa ℥i.
Misce f: [pulv]is. –

Pulv. contra terrorem.

℞. ☉ depur. ʒij.
Conch. ppt. ʒi.
Corall rubr. ppt. ʒß.
[pulv] diaphoret. ʒi.
Spec. de hyacint ʒß
M. f [pulv] div. 15. partes. Nimmt puls. davon alle 2. stunde eine zu unsm…

Pulv. Purgans. M ord. –

℞ Conch: pp ℥ij.
☿ii Dulcis
Diagryd. [symbol]at. aa ℥i.
M: f [pulv]. dos ℈i.

Pilul. ☿ial. ...

℞. Extr. Panchym: Croll.
☿ii Dulc. aa ʒiv.
M: f: Pil. ~

🜍 Purgans III ord.

℞ ☿ii dulc
🜍 Jalapp. aa ʒij.
🜍 Ind. flor.
🜂 ☉ii ultim[illegible] aa ℈j. M dos ℈j.

Pilul. Catarrh. ...

℞. Extr. Panchym: Croll:
☿ii Dulcis aa ʒviij
Resin Jalapp. ʒij
🝪 Foenicul. ʒiij
M: f. Pilul. ~ M. f. l. a. pil
ad pond. gr. j.

Ess. Balsamic. Stahlii

℞. Ess. Myrrha
Succin. S. S. aa ℥ß.
℗ d. Terebinth. gtt xxx.
Misce.

Ess Asthmat.

℞ Ess. Pimpinell: ℥iij
Chaccarill: ℥i.
Misce.

Mr. Pectoral. Junk.

℞ R. ♁ii ☿r.
Ess: stomach aa 1℥.
Oo anis. ʒi.
Misce. —

Mr. Resolvent. Junk.

℞. R. ♁ii ☿ vsat
Ess: succin
pimpinell. alb. aa ℥i
Misce. —

Syrupus pro Infanti Cg.

℞. Syrup Cichor cum Rhabarber
oxymel squillit aa.

Ess. Alexiph. —

℞ Ess. Catarrh.
Scordii aa ℥i.
Misce. —

Ess: Alexiphrm. Temp.

℞ Ess: Scordii ℥i
Pimpinell.
Vincetoxic. aa ℥ß.
Misce. —

Pulv. Sedativ. Junk.

℞. ⊕ Absorb. citr. ℥iv.
spec. d. Hyacinth ʒvi
Mel. ♁ Cinogl. ℥ii
Misce. —

Pulv Antifebril. Mil ord.

℞ ☿r Olat ⊕ depur
⊕ij diaphor: Conch ppp aa ℥i.
☿ facht: nostr. ℈v.
Misce. —

Pulv. Antispasmodicus Sthalii

℞. ⊕ depur ☿ Olat aa ℥ij
☿ fact: nostr ℥iij M.

⊕ Antepilepticus.

℞ ⊕ Lumbr. ✡tr. ℈iv.
Tal. Lepor.
☿ ⊕ii aa ℈j. M. div in viij pt
aequales. vid. p. 135.

Pulv. Temper. I ord.

℞. [symbol]r Olal.
O depur. aa ℥iß.
Conch. citr. ℥ij.
[symbol]is fact: nostr. ʒiij
Misce.

Pulv. Temper. II ord.

℞. Conch. pp.
O depur. aa ℥iv.
[symbol] factit. ʒviij
Misce.

Pulv. Temper. III ord.

℞. O. [illegible] depur. aa ℥iv.
Cort: Chaccarill. ℥ij.
[symbol] nat. pp. ℥i.
Misce f: [symbol].

Pulv. Antifebril: I ord.

Rx. ☉ Depur. Ocul. ♋ citr. l conch ppt.
♁ii diaphor. aa ℥ix.
Sacch. fact. nostr. ℥i ʒi.
misce f: ℞.

Pulv Antifebril. II. ord.

Rx. ☉ depur. Conch pp
Bezoard min. aa ℥ix.
Sacch. ♁ii pp^t ℥i ʒij.
misce.

-H:

Pulv. Antifebr: III. ordinis.

Rx. ♁ij diaphor:
Conch: pp^t.
☉ depurat
♄ri. Ocul. aa ℥vi.
Sacch. ℥ij.

Pil: Laxantes.

℞. Pil. Confort.
Extract panchym. Croll: aa ℈ß
Misce f. pil.

Ess. Laxant.

℞. Resin. Jalapp ʒi.
Res. Scamon. ʒß.
Solv. 🜋 ℥xvi adde
🜄 Cinamom. ʒi.
Syr. Rosat. Sol. ℥ii.
misce.

Pil. Laxantes

℞. M. Polychrest Ricter. l. Confort
Extract cathol aa ʒi. M. f. pil.

Pulv. digest. III ord.

℞. ♁ absorb. citr. e.g. conch. extr.
Tr. Blat. aa ℥ß.
Misce.

Pil. Purgantes.

℞ Extr. Panchym. Croll:
♁ rad Jalapp. ras. aa ʒij
Extr. Fumar.
Card. Bened: aa ʒß.
Scamon. ... at ʒiij
M. f. l. a. Pil. ad pond. gr 1.

Pil. Hydropic.

℞ Extr. Catholic ℥ij
Ellebor: nigr. ℥vj.
☿ dulcis ℥j.
Resin Jalapp.
Gum. Guttae aa ℥ß
℔ foenic. 120.

Pil: Cacochymic.

℞. Extract Hellebori nigr.
☿ dulc ppt aa ℥jv.
Troch Alcand.
Aloes Succotr. aa ℥ij.
M. f: pil. ad pond. gr. j.

Pil. Resolventes.

℞. Gum. Amoniac ⊕ squillit. sol: et inspiss. ℥i.
☿ dulcis ℥ß.
Aloes. ros. ℥ij.
Extr. fumar. ℥ijß
Helleb. nigr. ℥i.
Misce f: pil: ad pond. gr i.

Pil. Mundific.

℞ Extr. Helen.
gent. rubr.
galleops.
Sclareæ — aa ℥ij
Gum. Galban Myrrhæ
Mastich succin aa ℥iß
Ɛci ℥ij
Resin scamon ℈iv.
⊕ruc. ♂. apr. Stahlij
oo anis gtt. LX:
M: f: Pilul.

Pulv. Tonicus. –

℞. ♁ Caesar. ℈ß
Croc. ♂. apr. Stahl: ʒij
Misce f. pulvis. –

Ess. Purgans. –

℞. Rad. Jalapp. ℈iv.
Althea. ℈i.
Cort. Cinamom. ʒij
Extract c. Vi Recti
abstr. ut fiat Essent. ℔ $\frac{3}{4}$
Sine ℥ cand. dos. ʒij vel iij

Ess. Carminat. Junk.

Rs Essent. Gentian. rubr.
Centa. min. C.B.
Carminat Wedel. aa ℥ij
Misce.

Essent. Catarrhal.

Rs Rad. Imperat.
Helenij.
angelic.
valerian.
Carlin. aa ℔ i.
Pimpinel alb.
Vincetox. aa ℔ij.
V. Rectif. Mens. xij extrah. Essent. bene
saturatam.

Elix. Citri purgans.

℞. Rad. Jalapp. ℔i.
Sem. Cartham ℔ß.
Gum Gottae. Scammon. aa ℈viij
Spirit. Cort. citri. mij
Extrah. R. in 🜄 et abstr. ad g. à R.
ad ℥xij. adde 🜄. abstract. ℥vij
Misce. Dosis ʒiß ʒij ʒiiß.

Essent Hyppocondr. D. Junk.

℞. Essent. Chascarill.
milefolij aa ℔ß.
Ra ʒij 🜔 ifal. ℔i
Misce.

Pulv. Laxans I ord.

℞. ☿ii dulcis pp ℈iv.
Resin. Jalapp. amygd. dulc. ppt ℈iii
Sacch. alb. ℈vii.
Misce f. ♁.

℞. ⊕ depurat ʒii
Conch. ppt ʒß.
♁ Diaphoret. ʒi.
Species de hyacinth. ʒß
Misce f. ♁ in 15. part. S. Dispensi pulv
von dosen alle 2 Stunde eine zu nehmen

Pulv. Laxans II. ord.

℞. Conch ppt ʒij.
☿ii dulc.
Diagryd △at aa ʒj M. f. ♁.
♁ in purpura rubra.

℞. Conch ppt
cit. aa ʒi
⊕ dep. ℈j M. d. in viij pl.

vid p. 112.

Spec. ad: Infus. Lax. Junk:

℞. Rad. Chin. Sassaparill: Cichor.
Vincetox. aa ℥i.
Herb. Veron. Teuc. Mii
Meliss. Origan.
Chamædr. aa Mi.
Flor. Genist. aa p. iv.
Cort. Citri. ʒvi.
Fol. Senna. S. A. ℥ii.
Rad. Polypod.
fibr. Elebor. nigr. aa ℥ß
Hermodact. ʒii.
Crystall [symbol] ʒvi.

Infundat in [symbol] fervent. Mi et quando refrixerit ad Pat. Sin. Francon. mens. iii

Electuar. Antifebril.

℞. Rob. Junipi sambuci aa ℥i.
Cort. Chin. d. Chin. ʒvi
♁. Chaccarill. Diaphor.
Θxc. Depur.
Extr. Centaur. minor. aa ʒiß
♈ Θxc Vinos gtt. XL.
Misce f. Electuarium.

Pulv. Bezoard c. ♁

℞ Pulv. Bezoard. ℥iij
♁. fact. nost ʒiij
misce

Pulv. Sedativ. ~

℞. Opij correct c. ♃.
Extract helleb. nig. ▽os. aa ℔ß.
Myrrh. ʒiv.
Theriacal. ℥i ex Rad
Alexiphar. c. ♁. parat
Croci. or. ℥ij
Oo cl. Junip. ℥i.
Misce f: Pilular. ~

alia ♂ Sedativus.

℞. ♂ absorb. citr ʒi
Spec de Hyacinth. ʒiß
℞ de Cynoglos ʒß ℞ dosis
vid p. 259.

Pil. ad Hæmorrhoides.

℞. Pil. Confort ℥vi
Extr. Cent. min
Ellebori nig. aa ʒi.
Misce. fi: Pilular.

Theriaca Coelest Thal.

℞. Extract theriacal Thal ℥ß.
opii
hyosciam.
Myrrha electa
[illegible] bii aa ℥i.
ol. cinamom.
Cardamom aa ℈ß
⊖ viperar. ℥ß. M. f Massa

Methodus
In propinandis antecedentibus Compositis.
1. Pulveres.
Pulvis digestivus 1. ord.

Crassas viscidas impuritates primarum viarum ppt. resolvit et ad faciliorem eliminationem ejus disponit conducit in febribus intermittentibus cum pilularum Confert.

Pulv. Digest. 11. ord.

Differt a priori quod absorbens sit acidulati lenior et temperatiori modo, mamas profundius stagnantes viscos v.g. in mesenterio dirigent et ex stagnatione reserat, hinc in quartanis in atrophia etc. confert praesente aestu.

Pulveres Temperantes

Omnes motus exacerbatos partium solidarum potissimum, o exclusio tamen sanguinis orgasmo temperat; omnes ad temperationem disponit et acuit

Pulv. Temp. 1. ord.

Quasi

quasi generale temperans e; datus in spasmis hypocondriaco hystericis ordinariis in ophtalmia, cephalea &c. ad mitigandos motus spasticos et congestorios. Temperat enim leniter, demulcet spasmos et orgasmum in calculo, Ischuria, Stranguria, Dysuria, malo Ischiadico, Diabete, in casu podagricis affectibus. Est vere pis antispasmodicus; diureticus ad flatus ventriculi, haemoptysi vomitu et mictu cruentum &c. Hinc B. Stahlius recte vocavit flüss Stein und magen ♁.
In Gonorrhea maligna ad ardorem inflamationum in pene et ☿ temperandum. At in diuturniorem usu ob tonum relaxatum tonicum ipsi adiungatur.

♁ Temp. n. ord.

Confert ubi tussis cum spasmis concurrit in vitiis pectoris, hoemoptysi, sanguinis narium vomitu cruento aut aliis nimiis affectibus biliosis omnibus excretionibus nimiis. Ischuria &c. binis horis doss. 1. ad ℈j. nec non in emptione lactis ex ira..

♁ Temp. XXX. ord.

Fortius temperat pro cascarillam et paululum adstringit; in nimios fluxibus leniter sedat dissolvit in affectibus sanguinis et ubi adest sanguis congrumatus et dolores; id in dolor. capitis l. a vita sedentaria l. alia causa ortis &. nam roborat tonum in spast. affect.

Pulveres febriles.

Calx tii l. &. diaphoreticum, has pres ac febres determinant.

♁ Febr. I ord.

In plurimis febribus, quae se jam determinarunt et typum assumserunt sic in febribus acutis ut et in calore febrili ubi adest materia agilis et subtilis, quae per [illegible]am secundanda et evacuanda in congestionibus B. [illegible] potest omitti. —

♁ Febr. II. ord.

In affectibus biliosis, diarrhoea symptomatica; in febribus exanthematicis, acutis purpura variolis et morbillis ab initio ad [illegible]dam materiam et secernendam, postea ubi sudor adest; it ubi vomitus; it ubi

jam

jam efflorescentiæ cutaneæ, præsente æstu et ubi mat. subtilis est et agilior, diarrhoea symptomatica, purp: alba in omnibus excretionibus, nimiis cum commotionibus febr. conjunctis hi pres sæpe soli febres biliosas feliciter superaverunt.

Febr. III. ord.

Conducit ubi motus febriles quidem incipiunt certam faciem v. nondum assumserunt nec legitimum typum induerunt
1.) Bezoardicus est pro discussione leni febribus intermittentibus ubi simul materia viscida, mucida in primis viis, it. in puerperiis temperantis quoque effectus.
2.) Diureticus et diaphoreticus.
In omnibus affectibus vulgo constrictum dictis, in terrore bile, orgasmo cum æstu quodam conjuncto.
* obs. in febribus lentis omittimus Urina.

Laxans I. ord.

Generali magis scopo at satis moderate operatur, quia resina Jalappæ benigno oleoso subjecto tecta et obvoluta est, ne tormi nibus mo

molesta unde exoriat. Gustum praeterea grate afficit hinc sensibilioribus et delicatis infantilis, alia respuentibus, hinc comode propinari potest. At quia facile rancescit propter amygdalas hinc semper recens exist. adhibet.

℞ Laxans M. ord.

Speciali magis scopo dicatur ubi acres biliosae sordes in intestinorum canali obhaerescunt, quas in antecessum corrigit absorbendo acidum et hinc liberius & dulc. seroso lymphaticas, viscosas tenaces portiones ppt. incidit, colliquat, et junctim cum Bagridio eliminat.

Pulv. Resolvens.

In vitiis seroso lymphaticis e.g. in scabie phinaci chronica, lue gea in ulceribus cachecticis ut in tertio gradu Gonorrhoeae ubi infectio iam cute apparet, praescribitur quoq, in parotidibus, nodulis mamarum, hebetudine oculorum &c.

℞ Contra Acredinem.

Aciditates in ventriculum et intestina undecunq depositas et molestias digestivis excitantes corrigit, absorbendo, involvendo & in laudabiliorem substantiam convertendo ut

hum

hum comodius eliminari possit v. g. in bilio
affectibus post ira cundiam, soda.
it in scabie, diarrhoeis acribus a biliosa colu
vie, in dentitione difficili, ubi eadem causa
ludit, in variolis et morbillis observ. in
diarrhoeis ⊕ addi potest.

Purga Jalapæ
Salinorum admixtione. — v. g.

℞. Jalapp. pul. gr. XV
♀ri Olal. vel.
Cremor. ♀ri ℈ß. pro dosi propina-
ta tutissimum edunt effectum. —

Pro Phthisi et tussi
Plurimum extollit balsamum sulphuris
Crassum, quod ita fit
℞. Fl: sulphur ℥ß.
oo oliv. vel nucum l. sem:
papaver. alb. ℥iiß
bulliant in vase vitreato semipleno igne
convenienti adhibito, continuo spatula
agitando, ut rite dissolvantur flores et
sanguineam rubedinem acquirat mistura
horulæ spatio parata, vid. Tom Burnet
Tomus alter de phthisi pag. 604.

Dosis Massa Pilularum Confortantis

℞. Extract: Aloes Gumos.
Myrrhae ppt.
Absinth:
Cochlear:
Card: Bened: aa ℥xij
Fumar:
Hellebor: nigr: aa ℥viij
Gum: Heder: elect.
Sandarac aa ℔j
Terebinth: coct: V: ℔ß.
Misce.

℞. Aloes Gumos.
Myrrh ppt.
Gumi Juniper
Heder aa ℈j
Extr. Absinth vinos.
Card Bened vinos.
Cochleariae aa gr xvj
Fumar vinos.
Hellebor. nigr. V. aa gr viij
Terebinth Venet ℈ß.
M. f. l. a. Pil ad pondus gr. j.

DOSES MEDICAMENTORUM

A...

Acetosa infusa interne rarius, externe frequentius ad ℥ß. ʒvi. ℥i.

Aqua ess. simpl: ad ℥ij—iij compos. et e vino ad ℥ß. ʒvi. ℥i vel cochl. ß—1. et Ω=osa ʒij. ℥ß.—

B...

Balsama oosa ut oo Ω os: ut Ω.

C...

Condita et conserva ad ʒij ℥ß.

Cortices in 🜄 ad ℈i ʒß. ℈ij in infus. ʒij. ℥ß.

(280?)

E.

Electuar. alterad et bezoardad. ℈i. ʒß. — i–iii. leni=
entia ad ℥ß. ℥i–iß. purgad. ʒii. ℥ß–1.

2.| Extracta, Alterantia, ℈ß–1. ʒi. purgad. ℈ß
℈i. ʒß., resinosa nonnulla solum ad gr. V. ℈ß
anodyna gr. i–ii–iii–vi.

3.| Elexiria et Essentiae ad gut. XX. XXV. XXX
vel ℈ß. ʒß.–i. Essent. pretios. ad gut iii–
V.–X.

F.

1.| Fecula ℈ß–i.–ii.

2.| Flores (p. i. R. det. ʒi.–ii) ad p. i–ii–iii non=
nulli et M. ß. chemici gr. V. ℈ß. ℈i.

3.| Folia ad M. i–ii. excepti sennae qua ad ʒß
℥ß. et majoribus q numero prescribuntur.

4.| Fructus majores numero l. paribus ut nim:
℥ß–IV.

G.

Gelatina ʒi.–ii–vi. l. ℥i.

H.

Herbæ ut fol. M. i. – ij – iij in ℔ ℥i. – ij.

L.

1. Lapides pretiosi (in fragm.) a gr. iij – v. ℈ß. Ignobili ad ℈ß ʒß – i.
2. Liquores ad gut. vi. ℈ß ℈i.
3. Lixivia ad ℥ß – i.
4. Looh. ℥ß ℥i. – iß.

M.

1. Magisteria roborantia gr. v. ℈ß – i. ano-dyna gr. v. ℈ß. purga. ad gr. iij ℈ß.
2. MP. ℈ß – i. ʒß.
3. Mixturæ ℈i ʒß. ʒi.

O.

Olea cocta, infusa expressa, viliora ℥ß. – i. expres-sa praciosiora ℈i. ʒi – ij. dsta gut. i. ij – iij. Ol. sacarat. gr. vi. ℈ß. i.

P.

Præparata ℈ß – ℈i – ʒß.

Pulveres et sp. ces alterantes ℈i – ʒß – ʒi bezoard. ℈ß gr XV. ℈i. ʒß. purgantes ℈ß. – i ʒß. Chemici gr. V. ℈ß. i. Emetici gr. iij – IV.

R.

1./ Resinæ ℈ß ℈i ʒß.
2./ Rhabar. ʒi – ij ℥ß.
3./ Radices in ♁ ℈i ʒß. ℈ij in infusione et decocta ʒi – ij ℥ß – i.

S.

Salia, Lixivia fixa ℈ß. – i. volat.: gr. iij – V ℈ß. impprie dicta ℈ß gr. XV. – ℈i. coagulata. ℈ß. ℈i. ʒß.

Sapæ ℥ß. ʒi.

Syrupi ℥ß – i. l. nati grand. satis ad gratia.

Semina ℈i. ʒi.

Species alterantes ut. ♁ces pro decoto. ʒi – ij – iij externe ʒij ℥ß. ʒV.

Spiritus vegetabiles à ℈i ad ʒi. – ij – ℥ß. animales C. V. l. V. il: p se esti

a

à gut. V. ℈ß. ℈j. ʒß.
minerales acidi à gut. IV. ad ʒß.
medij ut ♀ aperitiv. Bino ʒß.–j.
Succi. ℥ß. ℥j. ut aquæ. –
Sumitates ut Flores. –

T. –

Terræ ut pulveres pparat ad ℈j–ʒß.
Tinchiræ contractiores gut. XX. XXV. XXX.
℈j–ʒß. dilutiores ʒij–iij ℥ß.
Trohisci alterantes ℈j. ʒß. ʒj. alhandali
gr. iij–V. loco simili anodyni gr. ij–
iij–V. s. n. j.–ij iij. –

Dos: Purgantium.

1º Magisterium s: Res: Jalapa purga Integra — gr. 20.
2º Scamonium Δat: — — — gr. 12
3º Tartarus Emeticus — — — — vi.
4º Trochisci Alhandal — — — XXI
5º Jalappa — — — — ℈ iv
6º Rhabarbarum — — — ʒ ij.
7º Siena ♁at — — — — ʒ ij
in infusione — — ℥ ß.

Mixta seu composita

Tart: Emet — — — — — gr. ij.
Magist: Jalappa — — — — xiv.
faciunt purga Integra

Scamoniū Δrat — — — — gr. vi.
Tart Emet — — — — — — iij.
etiā purga integra

Trochisci Alhandal — — — gr. vij.
Jalappa — — — — — — xxij
Rhabarbar — — — XL.
integra

Jalappa — — — — gr. LX.
Rhabarbar. — — — — — XL.
faciunt purga integra.

Vnguentum ad Ambustia

℞ ol. sem. Lini q.p. vel. e.q. ℥ij
Ceræ flav. ℥ß ʒj
Albuminc ovi Cum vitello N.° ij
M. fiat unguentum.